

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met het Vrouw – Moeder - Kind centrum, telefoon 0495 - 57 21 23.



Rotavirus

Vrouw – Moeder - Kind centrum
(VMK)

R265.15 2008-08

1012171

Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
T. 0495 - 57 21 00
www.sjgweert.nl

Uw kind is opgenomen omdat het mogelijk is besmet met het rotavirus.

U heeft al informatie van de arts of verpleegkundige gekregen en in deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.

Wat is het rotavirus

Het rotavirus is een virus dat een darminfectie kan veroorzaken.

Dit komt vooral voor in de eerste twee levensjaren, met een piek op de leeftijd van drie tot vijftien maanden. Maar ook een volwassene kan besmet worden door het rotavirus.

Infecties vinden vooral plaats tijdens koude en natte perioden, dus vooral in de winter.

Wat zijn de symptomen

De symptomen van besmetting met het rotavirus zijn:

- braken
- koorts
- waterige diarree

Vooraf de diarree kan snel tot uitdroging leiden. Is dit het geval, dan is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

In het algemeen verdwijnen de symptomen spontaan binnen vijf tot zeven dagen.

Hoe wordt de diagnose gesteld

Om tot een diagnose te komen wordt er ontlasting opgevangen en op kweek gezet. Hiermee worden twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek geeft al een uitslag binnen enkele uren. Het tweede onderzoek is gevoeliger en het duurt drie dagen tot de uitslag hiervan bekend is.

Wat is de behandeling

Een behandeling van het Rotavirus zelf is er niet. Antibiotica helpen niet tegen een virus. Daarom is de behandeling gericht op bestrijding van de symptomen. Het belangrijkste doel hierbij is uitdroging te voorkomen of te bestrijden. Dit kan door regelmatig kleine hoeveelheden ORS (= Orale Rehydratie-Solutie) toe te dienen. ORS is water waar een bepaalde hoeveelheid glucose en zout aan toegevoegd is. Voor de smaak kan het gemengd worden met een klein beetje ranja, appelsap of Roosvicee-stop.

Als er sprake is van ernstige uitdroging of veelvuldig braken, dan zal uw kind vocht toegediend krijgen door middel van een infuus. In dat geval is het mogelijk dat uw kind 24 uur niets te eten of te drinken krijgt zodat de darmen helemaal tot rust kunnen komen.

De arts spreekt dan per dag af of het eten en drinken kan worden uitgebreid.

Omdat het Rotavirus zeer besmettelijk is, is het nodig uw kind op de afdeling geïsoleerd te verplegen om verspreiding van het virus te voorkomen. Meer informatie vindt u in de folder "geïsoleerd verplegen."

Hoe vindt besmetting plaats en hoe kunt u dit voorkomen.

Besmetting met het Rotavirus vindt plaats via direct contact (besmette handen) of via indirect contact (besmette gebruiksvoorwerpen).

Het virus kan op handen tenminste vier uur overleven en op gladde oppervlakken zelfs enkele dagen!

Aangezien de infectie zich vooral van persoon tot persoon verspreidt, is het zorgvuldig wassen van de handen en goede persoonlijke hygiëne zeer belangrijk.

Op de afdeling is geïsoleerd verplegen noodzakelijk om verspreiding van het Rotavirus tegen te gaan. Omdat de ontlasting tot twee weken na de eerste ziektedag besmettelijk kan zijn, kan de isolatie pas gestopt worden bij ontslag. De isolatie kan ook opgeheven worden als in een nieuwe kweek geen Rotavirus meer gevonden wordt.

Wij geven u het advies om afwasbaar of uitwasbaar speelgoed (op 80°C) mee te nemen.