



Biologische teelt van broccoli

(*Brassica oleracea L. var. italica*)

Broccoli kan op diverse soorten grond worden geteeld. De grond moet goed gedraineerd zijn en een goede structuur hebben (bv. geen harde ondergrond), omdat de plant ondiepe wortels heeft. De plant heeft gedurende het hele groeiseizoen vocht nodig; op lichtere gronden kan irrigatie nodig zijn.

Teeltomstandigheden

Grond : goed gedraineerd, neutrale pH-waarde

Grondsoort : leem, zand of klei

Seizoen : jaarrond (in de winter alleen in gematigde gebieden zonder vorst. Gebruik geschikte variëteiten)

Vocht : gemiddelde watergift

Oogst/bewaring

Oogst de bloemschermen als de knoppen nog klein en goed gesloten zijn. Een te vroege oogst leidt tot te lichte bloemschermen en een te late oogst heeft losse bloemschermen als gevolg. Broccoli is niet lang houdbaar en moet zo snel mogelijk na de oogst worden verkocht.

Ongedierte- en ziektebestrijding

Pas gewasrotaties van 6 jaar toe voor alle Brassica-soorten. Houd een pH-waarde van meer dan 7,5 in stand om knolvoet te voorkomen. Stimuleer de aanwezigheid van nuttige insecten tegen bladluizen.

Productierichtlijnen

Gewas	Productie-seizoen	Normale zaai/plant-periode	Normale oogst-periode	Standaard rijbreedte (cm)	Ruimte tussen planten in rij (cm)	Plant-dichtheid/ ha
Broccoli (alleen modules)	vroeg	half maart -half mei	half juni - begin juli	50	40	45.000
	zomer	begin mei - half juni	begin juli - begin aug.	50	40	45.000
	herfst (vroeg)	half juni - begin juli	begin aug. - begin sept.	50	40	45.000
	herfst (laat)	begin juli - begin aug.	begin sept. - half nov.	50	40	45.000

