

# IBS Plant

## lijst 7 | kuipplanten

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**  
**Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL**



# Inhoud

1	Brugmansia		cv.		Engelentrompet
2	Citrus		cv.		Citrusboompjes
3	Cycas	revoluta			Vredespalm of Palmvaren
4	Ficus	carica			Vijg
5	Laurus	nobilis		edel	Laurier
6	Nerium	oleander			Oleander
7	Olea	europaea		europes	Olijf
8	Plumbago	auriculata		geord	Mannentrouw
9	Trachelospermum	jasminoides		lijkt op Jasminum	Sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn



# Brugmansia cv.

## Engelentrompet

-



- Breed struikvormende kuipplant, hoogte 1 – 3 m ZEER GIFTIG ALLE DELEN
- Blad heeft een lichtgroen groot blad gaaf randig en ovaal van vorm
- Grote welriekende hangende trompetbloemen met buisvormige kelk, tot 30 cm, 's avonds geurend wit tot witroze van kleur, bloeitijd juni – sept.

# Citrus cv.

## Citrusboompjes



- De hoogte van de citrusplanten kan per cultivar verschillen, van 2 – 4 m hoog
- De bladeren zijn fris groen van kleur ovaal vormig en lichtjes gezaagd
- De wit / roze bloesem is sterk ruikend, bloeitijd mei – september



# Cycas revoluta

## Vredespalm of Palmvaren

-



- Deze plant behoort tot de palmvarens, naaktzadige planten enigszins op kleine boompjes lijkend, ze zijn meer verwant aan coniferen dan aan palmen of varens
- Stevige langwerpige bladeren die ondanks langzame groei na een aantal jaren tot wel 1 m kunnen groeien
- Bloemen komen voor bij de mannelijke Cycas, lijken op een kegel

**Yuverta**

# Ficus carica

## Vijg

-



- Bladverliezende sierheester kan tot 3 m hoog en 5 m breed worden
- Blad is dik, leerachtig, hebben een hartvormige voet en zijn 3 – tot 5 lobbig, donkergroen en ruw behaard
- Bloemetjes heeft de vijg niet, in feite zijn de vruchten tevens de bloemen, bloeitijd juli – sept. De vijgen worden meestal in okt. geoogst



# Laurus nobilis

## Laurier

nobilis = edel



- Wintergroene, opgaande struik of kleine boom, hij is tweehuizig, dus mannelijke en vrouwelijke planten
- De bladeren zijn leerachtig, ongetand soms wat golvend, glanzend donkergroen, de aromatische laurierbladen worden in de keuken gebruikt
- Kleine, lichtgeelgroene bloemen, kleine, glanzende zwarte besachtige steenvrucht, bloeitijd maart – mei

# Nerium oleander

## Oleander

-



- Rijk vertakte, bossige 2 – 6 m hoge struik
- Blad meestal in kransen 3 – 4 stuks, leerachtig, 10 – 22 cm lange toegespitste bladeren, middennerf is opvallend dik
- Geurende eindstandige bloemen, zijn wit tot rozerood, bloeitijd juni – sept.



# Olea europaea

## olijf

europaea = Europees



- Wintergroen, tot maximaal 5 m hoog
- Fris groen- grijs blad. Lancetvormig, gaafrandig, bovenzijde grijs/groen, onderzijde grijs met duidelijke nerf
- Bloempjes zijn wit- geel, zeer klein, maar door uitbundige bloei valt deze op, olijven 1 – 2 cm, zijn niet te eten en zijn erg bitter

# Plumbago auriculata

## Mannentrouw

auriculata = geoord



- De plant heeft tot 150 cm lange twijgen
- Verspreid staande lichtgroene bladeren, zijn ovaal of eirond en 3 – 9 x 1 – 3 cm groot
- De bloemen groeien eindstandig 2 – 6 cm lang in trossen, de 3 cm brede, blauwe bloemen bestaan uit 5 bloemblaadjes, bloeitijd mei – september



# Trachelospermum jasminoides

## Sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn

jasminoides = lijkt op Jasminum



- Groenblijvende houtachtige liaan die tot 3 m hoog kan worden, jonge twijgen aanvankelijk behaard
- Bladeren zijn tegenoverstaand ovaal tot lancetvormig, 2 – 10 lang met een hele magere spitse top, donkergroen en verkleurend naar brons
- De geurige bloemen zijn wit 1 – 2 cm in diameter, met een buisvormige bloemkroon, bloeitijd juni - sept.





# einde presentatie