

IBS Plant

lijst 6 heesters

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud



HEESTERS				
Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Aesculus	parviflora		kleinbloemig	Struikpaardenkastanje
2 Aralia	elata		hoog/verheven	Duivelswandelstok
3 Aronia	melanocarpa		zwartvruchtig	Appelbes
4 Berberis	verruculosa			een Zuurbes
5 Callicarpa	bodinieri	'Profusion'		Schoonvrucht
6 Caragana	arborescens	'Pendula'	boomachtig	Erwtenstruik
7 Clerodendrum	trichotomum			Pindakaasboom
8 Cornus	controversa			Reuzenkornoelje
9 Corylopsis	pauciflora		armbloemig	Schijnhazelaar
10 Cotinus	coggygria	'Royal Purple'		Pruikenboom
11 Edgeworthia	chrysantha			Papierstruik
12 Elaeagnus	ebbingei			Olijfwilg
13 Euonymus	alatus		ge vleugeld	een Kardinaalshoed
14 Hamamelis	intermedia	'Arnold Promise'	tusseninstand	een Toverhazelaar
15 Hamamelis	mollis		zacht	een Toverhazelaar
16 Hibiscus	syriacus	'Hamabo'	uit Syrië	Tuinhibiscus
17 Hypericum	inodorum	'Elstead'		een Hertshooi
18 Ilex	meserveae	'Blue Prince'		Blauwe Hulst
19 Magnolia	liliflora	'Nigra'		Beverboom
20 Mahonia	japonica	'Hivernant'	uit Japan	een Mahoniestruik
21 Potentilla	fruticosa	'Abbotswood'	heesterachtig	Ganzerik
22 Ribes	sanguineum	'Atrorubens Select'	bloedrood	Rode Ribes
23 Sambucus	racemosa		trosvormig	Bergvlier
24 Spiraea	japonica	'Little Princess'	uit Japan	een Spierstruik
25 Symphoricarpos	chenaultii	'Hancock'		een Sneeuwbes
26 Tamarix	ramosissima			Tamarisk
27 Viburnum	bodnantense	'Dawn'		Winterbloeiende roze Sneeuwbal

Aesculus parviflora

Struikpaardenkastanje

parviflora = kleinbloemig




- Een brede struik, uitbreidend door middel van worteluitlopers, 3-4 m hoog
- Blad met 5 tot 7 gesteelde blaadjes, 7-5 cm lang, omgekeerd eirond, aan de onderzijde grijsbehaard
- Jonge twijgen aanvankelijk olijfgroen, later grijsbruin, weinig vertakkingen, zijknoppen klein, bij de eindknop is de onderste schub langer dan de halve knoplengte

Aesculus parviflora

Struikpaardenkastanje

parviflora = kleinbloemig



- Crêmewitte bloemen (juli-augustus), in tot 30 cm lange, opstaande trossen
- Gladde vruchten niet zoals bij de paardenkastanje boom, daar zitten stekels op de bolster
- Geelachtige herfstkleur

Aralia elata

Duizelwandelaarstok

elata = hoog



- Een hoge, open struik, dikwijls wortelopslag vormend, kan tot 10 m hoog worden
- Bladeren zomergroen, dubbel, soms driedubbel geveerd, 40-80 cm lang
- Blaadjes 5-2 cm eirond, onderzijde grijsgroen, soms gestekeld

Aralia elata

Duizelwandelstok

elata = hoog



- Kleine, crème witte bloemen (aug-sept) in grote, eindstandige, schermvormige pluimen, 35 cm
- Dikke gestekelde, weinig vertakte grijze twijgen, grote eindknop
- Zwarte bessen, en een rode herfstkleur

Aronia melanocarpa

Appelbes

melanocarpa = zwartvruchtig



- Een tot 1 m hoge, gedrongen groeiende struik
- Blad, 2 -6 cm lang, ovaal tot omgekeerd eirond, plotseling toegespitst, bladvoet wigvormig, bovenzijde iets glanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen
- Twijgen dun en kaal, knoppen aanliggend spits en karmijnrood

Aronia melanocarpa

Appelbes

melanocarpa = zwartvruchtig



- Bloemen (mei) wit, iets naar roze verkleurend, in tot 4 cm brede, vrijwel kale tuilen
- Fraaie oranje tot bruinrode herfsttinten
- Vruchten 6-8 mm glanzend zwart

Berberis verruculosa

een Zuurbes



- Een bolronde, veel gekweekte, winterharde soort, hoogte 1-2 m
- Blad, 1-2,5 cm lang, rand met 2-4 stekelige tanden, eirond, bovenzijde glanzend donkergroen
- Jonge twijgen rond, geelbruin, bladdoorns geel, 3-delig en 1,5 cm lang

Berberis verruculosa

een Zuurbes



- Bloemen (mei-juni) tot 1,5 cm, geel, 1-2 bijeen
- Vruchten 6-8 mm lang, blauwpurper, berijpt
- Zeer geschikt voor vakbeplanting

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Schoonvrucht



- Een dichte vertakte, 2-3 m hoge struik met een opgaande groeiwijze
- Blad 5-12 cm lang, ovaal, lang toegespitst, bovenzijde donkergroen, bladrand gezaagd
- Jonge twijgen aanvankelijk behaard, later kaal, grijsbruin, smalle, behaarde, naakte knoppen, tegenoverstaand geplaatst

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Schoonvrucht



- Bloemen (juli-aug) lichtroze, 5-6 mm lang
- Opvallende violette vruchten (okt-nov) 2-3 mm doorsnede in gedrongen trossen
- Herfstkleur violet-rood

Caragana arborescens 'Pendula'

Erwtenstruik

arborescens = boomachtig



- Een sierlijke, zwakker groeiende cv met een overhangende vertakking
- Blad, evengeveerd, met 8-12 blaadjes, 1,5-2,5 cm lang omgekeerd eirond
- Twijgen groen, eerst behaard, later kaal, takken donkergrijs met afschilferende draden, knoppen verspreid, met 2 doornachtige steunblaadjes

Caragana arborescens 'Pendula'

Erwtenstruik


arborescens = boomachtig



- Vlinderbloemen (mei)
- Bloemen geel, 1-3 bijeen, circa 2 cm lang, okselstandig geplaatst
- Peulvruchten 3-5 cm lang

Clerodendrum trichotomum

Pindakaasboom



- Een circa 6m meerstammige struik, bij wrijving sterk naar pindakaas geurend, kroon: rond, half open
- Blad eirond tot hartvormig, 8-15 cm donkergroen, bladrand gekarteld
- Twijgen lichtgrijs kleine knoppen en een groot rond bladmerk

Clerodendrum trichotomum

Pindakaasboom



- Bloemen wit met donkerrode kelk in tuilen, doorsnede 20 cm, bloeitijd aug-sept, geurende bloemen
- Vruchten circa 1 cm grote prachtige diepblauw gekleurde bessen die omgeven worden door een aanblijvende, donkerrode kelk
- Plant is giftig

Cornus controversa

Reuzenkornoelje



- Kleine boom waarvan de horizontale, in etages groeiende, vertakkingen het belangrijkste kenmerk is, hoogte 6-8 m
- Afwisselend geplaatste blad is onregelmatig in vorm en grootte en heeft een glanzend donkergroene kleur, onderzijde is blauwgroen, gawe bladrand, breed eirond
- Twijgen en knoppen kleuren van roodbruin naar grijs

Cornus controversa

Reuzenkornoelje



- Crèmewitte bloemen, in schermvormige tuilen, bloeitijd mei-juni
- De vele kleine, donkerblauwe bessen verschijnen in het najaar
- Purperrode herfstkleur

Corylopsis pauciflora

schijnhazelaar

pauciflora = armbloemig



- Een circa 100 cm hoge, fijn vertakte struik
- Blad 3-6 cm lang, eirond, getand, spits dikwijls met een scheve, hartvormige voet, bovenzijde blauwgroen, onderzijde behaard, blauwgrijs, 5-7 paar zijnerf
- Twijgen dun, uitstaand, aanvankelijk behaard, later kaal, lichtbruine gesteelde knoppen

Corylopsis pauciflora

schijnhazelaar

pauciflora = armbloemig



- Bloemen (maart-april) zwavelgeel, 2-3 bijeen in korte aren, de meeldraden met oranje-rode helmknoppen steken buiten de bloem
- Vruchten hebben weg van een gehoornd hazelnootje,
- Gele herfstkleur

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Pruikenboom



- Een 2-3 m hoge en brede struik met opgaande twijgen
- Bladeren, 4-8 cm lang, omgekeerd eirond tot ovaal, stompe top en een iets wigvormige tot afgeronde voet, gave bladrand, bovenzijde donker purperrode en een roodachtige onderzijde
- Jongere twijgen groen tot paarsbruin, glad, lichtbruine lenticellen, knoppen verspreid, klein, met vele, bruin gekleurde schubben

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Pruikenboom



- Bloemen mei-juni klein, geelgroen, meestal onvruchtbaar, in grote eindstandige, 15-20 cm lange pluimen
- Vruchten komen zelden voor, een soort oranje-bruine boon
- De bloemen zelf vallen spoedig af doch de lange, violette stelen met afstaande haren blijven aan en verlengen zich (vandaar de naam Pruikenboom)

Edgeworthia chrysantha

Papierstruik



- Een vaasvormige, struik met open kroon, grillig groeiend, hoogte 1-2 m
- Blad, donkergroen, leerachtig, enkel, afwisselend lancetvormig
- De relatief dikke twijgen zijn kaneelbruin en bijzonder buigzaam, de gladde, oude bast is donker bruin tot grijsbruin,

Edgeworthia chrysantha

Papierstruik



- Bloemen zijn geel, zoete geur, in trossen aan het uiteinde van de twijgen, bloeitijd febr-april
- Afzonderlijke bloemen zijn trompetvormig binnenzijde geel buitenzijde zilver grijs
- De bloemknoppen zijn voor de winter al zichtbaar als knikkende groene hoofdjes

Elaeagnus ebbingei

Olijfwilg



- Een tot 3 m hoge, breed uitgroeiende struik met een opgaande vertakking
- Bladeren ovaal, bovenzijde glanzend groen
- Onderzijde blad zilverkleurig, soms met bruine punten, 7-10 cm lang

Elaeagnus ebbingei

Olijfwilg



- Bloemen sept-okt wit, 3-6 bijeen geurend
- Twijgen het 1^e jaar bruin, later donkerder, twijgen dikwijls gedoornd
- Meestal vlezige, besvormige steenvruchten

Euonymus alatus

Een Kardinaalshoed

alatus = gevleugeld




- Een brede, compacte, 2-3 m hoge struik
- Bladeren, eivormig tot ovaal, 3-7 cm lang, fijn en scherp gezaagd
- Twijgen en takken opvallend door 4 brede, bruine kurklijsten, knoppen eivormig en sterk afstaand

Euonymus alatus

Een Kardinaalshoed

alatus = gevleugeld



- Bloemen mei-juni, 2-3 bijeen, groengeel, weinig opvallend,
- Vruchten bruinrood, zaden bruin met een oranje vlezig zaadmantel (arillus)
- In de herfst fraai rood verkleurend en vrij lang aanblijvend

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise'

Een Toverhazelaar

intermedia = tusseninstaan



- Een tot 3 m hoge struik, fors breed uitgroeiend
- A- symmetrische bochtig getande bladeren, omgekeerd eirond 8-15 cm lang aanvankelijk behaard
- Twijgen lichtbruin aanvankelijk behaard later kaal, naakte knoppen, bloemknoppen enkele bijeen aan korte zijtwijgen

Hamamelis intermedia 'Arnold Promise'

een Toverhazelaar

intermedia = tusseninstaan




- Bloeitijd dec-maart
- Bloemen in okselstandige trossen 3-5 bijeen, bloem bestaat uit 4 lintvormige kroonbladeren
- Herfstkleur gelig groen

Hamamelis mollis

een Toverhazelaar

mollis = zacht



- Een forse, breed uitgroeiende tot circa 3 m hoge struik
- Bladeren omgekeerd eirond, 8-15 cm lang, asymmetrisch, bochtig getand
- Aanvankelijk aan beide zijde wollig, viltig behaard, later kaal aan de bovenzijde de onderzijde blijft viltig met duidelijk lichte nerven

Hamamelis mollis

Een Toverhazelaar

mollis = zacht




- Twijgen viltig, lichtbruin behaard, naakte knoppen
- Bloeitijd december-januari, goudgeel
- Bloemen zijn goudgeel, kroonbladeren 15-17 mm lang, iets gegolfd, kelk is bruin, aangename geur

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrie



- Een dichte, opgaande, 2-3 m hoge struik
- Blad eivormig, 5-9 cm meestal drielobbig, soms meerlobbig of ongelobd, bovenzijde frisgroen en glad, onderzijde grijsgroen, grove tanding
- Twijgen grijs, aanvankelijk viltig behaard, later kaal, knoppen verspreid, driehoekig bladmerk

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrie



- Bloemen wit met een rood hart, bloeitijd aug-sept, breed trechtervormend 6 cm breed, alleenstaand
- Opvallend is de plaatsing van de meeldraden op de stijl
- Een droge, openspringende doosvruchten

Hypericum inodorum 'Elstead'

een Hertshooi



- Een dichte, 50-70 cm hoge heester
- Bladeren halfwintergroen, eirond-ovaal, 3-8 cm lang, blauwachtig groen, bladrand gaaf
- Bloemen (juli-oktober)

Hypericum inodorum 'Elstead'

een Hertshooi



- Bloemen in de bovenste bladoksels in veelbloemige tuilen geplaatst, goudgeel, 2,5 cm doorsnede
- Kelkbladen blijvend na de bloei teruggeslagen
- Mooie aanvankelijk helder lichtend rode, later bruinzwarte vruchten

Ilex meserveae 'Bleu Prince'

Blauwe Hulst



- Een 2-4 m hoge, dichte struik
- Blad warmglanzende, blauw groene kleur, fijn stekelig ovaal blad
- Twijgen zijn mooi paarsig van kleur

Ilex meserveae 'Bleu Prince'

Blauwe Hulst



- Bloemen zijn crème wit en klein,
- Krijgt geen bessen omdat de 'Bleu Prince' een mannelijke plant is
- Kan uitstekend gebruikt worden voor hagen, omdat ie mooi dicht groeit.

Magnolia liliflora 'Nigra'

Beverboom



- Een betrekkelijk zwak groeiende, schaars vertakte Magnolia, hoogte 1-2 m
- Bladeren 10-12 cm lang, omgekeerd eirond, bovenzijde glimmend groen, onderzijde op de nerven behaard
- Twijgen kaal, met opvallende grote viltig behaarde bloemknoppen, bladknoppen kleiner

Magnolia liliflora 'Nigra'

Beverboom



- Bloemen (mei-juni)
- Buitenzijde donkerpurper, binnen veel lichter, slank gevormd, 12 cm lang, 6 kroonbladen
- Bloemen openen zich hier zelden helemaal

Mahonia japonica 'Hivernant'

Een Mahoniestruik

japonica = uit Japan



- Een circa 100 -50 cm hoge, opgaande struik
- Bladeren 30-50 cm lang met 13-15 ellipsvormige leerachtige blaadjes, oneven samengesteld
- Eindblaadje niet of iets groter dan de zijblaadjes, aan iedere zijde 4 tot 5 scherpe tanden, dof tot matglanzende, lichtgroene bovenzijde

Mahonia japonica 'Hivernant'

Een Mahoniestruik

japonica = uit Japan



- Bloeitijd (jan-april)
- Bloemen lichtgeel in overhangende, 20 cm, pluimen geplaatst, geurend
- Vruchten donkerblauw berijpt

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Een 50-80 cm hoge, breed uitgroeiende vorm
- Blad, verspreid, aan bloeitwijgen, meestal vijftallig waarbij de 3 topblaadjes met de spil zijn vergroeid
- Twijgen roodbruin, aanvankelijk behaard, later kaal en afschilferend, knoppen achter bladresten verborgen

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Bloemen mei-sept, helderwit, 2-3 cm doorsnede, 5-tallig, één of meerdere bijeen eindstandig
- Doosvruchten
- Veel toegepast in groepen, hagen, randen als bodembedekker

Ribes sanguineum 'Atrorubens Select'

Rode Ribes

sanguineum = bloedrood



- Een opgaande, 2-2,5 m hoge bloemheester
- Blad 3-5 lobbig, 5-10 cm breed, gekarteld, bovenzijde donkergroen behaard, onderzijde grijsviltig
- Twijgen roodbruin, klierachtig behaard, knoppen spits, roodgroen

Ribes sanguineum 'Atrorubens Select'

Rode Ribes

sanguineum = bloedrood



- Bloemen (april-mei) roze-rood, in afstaande tot hangende, ongeveer 8 cm lang
- Rijkbloeiende trossen
- Bessen blauw, berijpt, circa 1 cm doorsnede, met enkele klieren bezet

Sambucus racemosa

Bergvlier

racemosa = trosvormig



- Een 2-3 m hoge, breed uitgroeiende struik
- Met overstaande, onevengeveerde bladeren en regelmatig gezaagde blaadjes, lancetvormig 7-15 cm
- Twijgen bruin, met lenticellen, knoppen bolrond, naast elkaar staand, bruingroen, groot bladmerk

Sambucus racemosa

Bergvlier

racemosa = trosvormig



- Merg is bruin van kleur
- Bloemen (april-mei) geelgroen van kleur, in compacte, eivormige, 4-6 lange pluimen
- Vruchten scharlakenrood

Spiraea japonica 'Little Princess'

Een Spierstruik

japonica = uit Japan



- Een 50-70 cm hoog, bolrond struikje
- Blad lichtgroen, eirond – langwerpig, gezaagde bladrand langs de nerven lichtjes behaard
- Twijgen aanvankelijk groen, later purperbruin en kaal, bijna rond, knoppen groenbruin, klein en spits

Spiraea japonica 'Little Princess'

Een Spierstruik

japonica = uit Japan



- Bloemen (juni-juli) roze, tot lichtroze verkleurend,
- Bloemen eindstandig geplaatst, zeer gedrongen, iets bolronde tuilen
- Toepasbaar in vakken, randen en haagjes

Symphoricarpus chenaultii 'Hancock'


een Sneeuwbes



- Een opgaande, sierlijk vertakte struik, tot ongeveer 150 cm hoog groeiend
- Blad eirond, 1-2 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwgroen, blijvend dicht, wit behaard
- Jonge twijgen roodachtig, later bruin, fijn behaard, knoppen klein

Symphoricarpus chenaultii 'Hancock'

een Sneeuwbes



- Bloemen (juli-sept) , roze, in korte, eindstandige bloeiwijze
- Vruchten vrijwel rond, 4-8 mm dik, meestal rood met witte punten, ook wel witroze met rode punten
- Besheester o.a. voor grovere beplanting

Tamarix ramosissima

Tamarisk



- Een 2-3 m hoge, opgaande struik met sterk overhangende twijgen
- Bladeren blauwgroen, lancetvormig, schubvormige, circa 3 mm lange bladeren die elkaar dakpansgewijs bedekken
- Twijgen rond en roedeachtig

Tamarix ramosissima

Tamarisk



- Twijgen slank, vooral in de winter geelachtig bruin, zeer kleine knoppen, vaak achter bladresten verborgen
- Bloemen (juli-sept) rozerood in de knop, later helderroze, in tot pluimen verenigde trossen
- Bloemschijf 5-lobbig, kroon 5-tallig

Viburnum bodnantense 'Dawn'

Winterbloeiende roze Sneeuwbal



- Een 2-3 m hoge, strak opgaande, gedeeltelijk in de winter bloeiende struik
- Blad, spits ovaal, 4-7 cm lang, bruinachtig uitlopend, bovenzijde matglanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen met dikke, spaarzaam behaarde uitspringende nerven
- Twijgen kaal, roodbruin, knoppen spits, kaal, lichtbruin

Viburnum bodnantense 'Dawn'

Winterbloeiende roze Sneeuwbal



- Bloemen (nov-april), lichtroze, ruikend, in 3-5 cm lange, bolvormige pluimen
- Vruchten (rijpend in juni) rood, later zwart, hier zelden voorkomend
- Herfstkleur bruinrood



einde presentatie

10-11-2023 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta