

IBS Plant

lijst 7 | klim-, slinger- en leiplanten

Hovenier niveau 2 BOL-BBL

Inhoud

1	Clematis	Jackmanii Group		Bosdruif
2	Fallopia	baldschuanica		Bruidsluier
3	Parthenocissus	quinquefolia	= vijfbladig	Wilde Wingerd
4	Parthenocissus	tricuspidata	= drielobbig	Oosterse Wingerd



Clematis Jackmanii Group

Bosdruif

-



- Zomergroene, klimmende struik
- Overstaande, enkelvoudige of samengestelde bladeren, langwerpig tot smal eirond, 2 – 5 cm lang
- De lange twijgen zijn zeshoekig , het klimmen geschiedt dmv rankende bladstelen

Clematis Jackmanii Group

Bosdruif

-



- Grootbloemig, 4 – 6 bloemdekbladen
- Bloeit op jonge scheuten in juli - september
- Vruchten met 2 – 3 cm lange veerachtige behaarde, zilverkleurige stijlen

Fallopia baldschuanica

Bruidsluier

-



- Hoogte 100 tot 400 cm. Slingerplant
- Ovaal tot hartvormig friskgroene bladeren
- Witte trosvormige bloemen (juli-oktober)

Fallopia baldschuanica

Bruidsluier

-



- Blad en rank winden zich om alles heen om zich vast te houden
- In de herfst wit in trossen staande zaden
- Snelle groeier

Parthenocissus quinquefolia

Wilde Wingerd

quinquefolia = vijfbladig



- Hoogte 10 tot 20 meter, hechting doormiddel van zuignapjes
- Handvormige deelblaadjes gezaagde bladrand (5 deelblaadjes)
- Roomwitte onopvallende bloemen (april-mei)

Parthenocissus quinquefolia

Wilde Wingerd

quinquefolia = vijfbladig



- Blauwe bessen zijn in de zomer al zichtbaar
- Opvallende herfst tinten tot donker rode bladeren

Parthenocissus tricuspidata

Wilde Wingerd

tricuspidata = drielobbig



- Een ongeveer 20m hoge, zelfhechtende klimplant
- Bladeren deels enkelvoudig, breed eirond, 10 – 20 cm breed, met 3 spitse, grof gezaagde lobben
- Herfstkleuren zijn oranjegeel tot scharlakenrood

Parthenocissus tricuspidata

Wilde Wingerd

tricuspidata = drielobbig



- Twijgen met korte, veel vertakte, in hechtschijfjes eindigende ranken
- Bloemen (juli – aug) 0,5 cm geelgroen, in korte knikkende pluimen
- Vruchten 0,5 cm donkerblauw, berijpt



einde presentatie