

# IBS Plant

## lijst 1 | wilde flora

**Hovenier niveau 2 BOL-BBL**



# Inhoud

## WILDE FLORA OF INHEEMSE FLORA | alleen Nederlandse naam kennen

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Achillea	millefolium		Duizendblad
2 Atriplex	hortensis		Tuinmelde
3 Calystegia	sepium		Haagwinde
4 Cirsium	arvense		Akkerdistel
5 Alytrigia	repens		Kweek
6 Equisetum	arvense		Heermoes
7 Erigeron	canadensis		Canadese Fijnstraal
8 Galium	aparine		Kleefkruid
9 Linaria	vulgaris		Vlasbekje
10 Persicaria	maculosa		Perzikkruid
11 Plantago	major		Grote Weegbree
12 Poa	annua		Straatgras
13 Polygonum	aviculare		Varkensgras
14 Ranunculus	repens		Kruipende Boterbloem
15 Rumex	obtusifolius		Ridderzuring
16 Senecio	vulgaris		Klein Kruiskruid
17 Solanum	nigrum		Zwarte Nachtschade
18 Sonchus	arvensis		Akkermelkdistel
19 Stellaria	media		Vogelmuur
20 Tanacetum	vulgare		Boerenwormkruid
21 Taraxacum	officinale		Gewone Paardenbloem
22 Trifolium	repens		Witte Klaver
23 Urtica	dioica		Grote Brandnetel

# Achillea millefolium

## Duizendblad



- Dubbel veerdelig blad
- Schermvormige tuilen of trossen met witte soms naar roze neigend, bloeitijd juni-nov
- Wortelonkruid, voedselrijke bodem, hoogte 15-50 cm

# Atriplex hortensis

## Tuinmelde



- Een 1-2 m hoge bladgroente, groen of rood/purper van kleur
- De bloempluimen hebben dezelfde kleur als het blad, bloeitijd aug-sept
- Onderste bladeren zijn hartvormig - driehoekig, iets spits, gaafrandig of zwak getand, de middelste bladeren zijn langwerpig met spiesvormige voet

# Calystegia sepium

## Haagwinde



- Trechtervormige bloemen, wit van kleur, bloeitijd vanaf juni tot in de herfst
- Slingerplant, kan tot wel 3 m hoog komen
- Blad is langwerpig tot eirond tot driehoekig, hebben vaak een pijl- tot spiesvormige voet en een spitse top

# Cirsium arvense

## Akkerdistel



- Is een overblijvende wortelonkruid, kan tot 1m hoog worden, de stengels zijn stekelig
- Langwerpig ingesneden stekelachtig blad, donkergroen, randen zijn stekelig getand met zwakke tot sterke stekels
- De bloemhoofdjes staan op stelen, lila tot paars van kleur, bloeitijd juni-oktober, iedere plant kan tot 4000 of meer zaden produceren

# Alytrigia repens

## Kweek



- Lijnvormige bladeren, wordt tot 60 cm hoog
- Blauwgrijze aar (zomer), bloeitijd juni-sept
- Ondergrondse uitlopers, de bladschede van het onderste blad is behaard, en zijn dofgroen

# Equisetum arvens


## Heermoes



- Stengel bestaande uit segmenten, deze kan tot 80 cm hoog worden
- Hardnekkige wortelonkruid
- Sporen rijp in april-mei

# Erigeron canadensis

## Canadese Fijnstraal



- Langwerpige bladeren (overwinterd als bladrozet, bladeren hebben daar een spatelvorm en wijd getand)
- Kleine bloemhoofdjes samen vormt een pluim, wit van kleur, bloeitijd juli-sept
- Behaarde stengel en bladeren, kan tot 1 m hoog worden

# Galium aparine

## Kleefkruid



- De bladeren zijn boven het midden het breedst en eennervig de randen hebben weerhaakjes, staan in kransen bijeen
- Vierkante steel, kan tot 150 cm hoog worden
- De witte kleine bloempjes staan in tuitjes, bloeit van mei tot nov, veel forser dan de bloempjes en ook duidelijker zichtbaar zijn de vruchtjes, bolletjes vol borstelharen

# Linaria vulgaris

## Vlasbekje



- Gele gespoorde bloemen met een oranje vlek, bloeitijd juni-nov
- De plant kan 30-90 cm hoog worden
- Lijnvormige bladeren staan boven in de plant- verspreid maar onderin vormen ze kransen

# Persicaria maculosa

## Perzikkruid



- Groen lancetvormige en gaafrandige bladeren met een donker, bruin tot zwarte vlek midden op het blad
- De eenjarige plant kan tot 1 m hoog worden, aan de voet van het blad bevindt zich een bruin tuitje met korte haartjes bezet
- Roze rode bloemhoofdjes zijn in schijnaartjes (bloeiwijze) gerangschikt, bloeitijd juni-dec

# Plantago major


## Grote Weegbree



- Tredplant, meerjarig, hoogte 10-50 cm
- Bladeren staan allemaal in een wortelrozet bij elkaar en zijn bijna cirkelrond of elliptisch, bladrand is gaaf en de nerven zetten zich voort in de tamelijk lange steel
- Bloeiwijze aarvormig, bruinachtige bloemkroon en witachtige helmdraden

# Poa annua

## Straatgras



- Straatgras is eenjarig, maar de zaadvorming gaat het hele jaar door, hoogte maximaal 40 cm
- Bloemen zijn kleine pluimen met witte tot lichtgroene aartjes, bloeiwijze jan - dec
- Lijnvormig blad spits toelopend, vaak komen er gerimpelde blaadjes voor, alsof ze ergens zijn blijven steken toen ze begonnen te groeien

# Polygonum aviculare

## Varkensgras



- Tredplant, hij groeit tegen de bodem en spreidt zich in matten uit en kan hooguit zo'n 40 cm worden
- Blad heeft geen bladsteel, ze zijn klein max 4 cm, langwerpig eirond tot lancetvormig
- Bloem uit bladoksel 3mm waar aan de voet een vliezig tuitje staat, zit een aantal bloemetjes waarvan de kleur varieert van groen tot wit en rood, bloeitijd: mei-nov

# Ranunculus repens

## Kruipende Boterbloem



- Geribbelde stengels, hoogte 10-50 cm
- Wax-achtige kroonbladeren, vijftallig licht behaarde kelkbladeren, en vijf botergele kroonbladeren, bloeitijd april-juli
- Bladeren langgesteeld, meestal behaard, zijn in 3 lobben verdeeld, de middelste lob is gesteeld, bladrand is gaaf

# Rumex obtusifolius

## Ridderzuring



- Stengel geribd of geribbeld, forse plant tot 1,5 m hoog
- Bloemen zitten in een groep bijeen in een vertakte vrij open pluim met naar boven gebogen pluimtakken, bloemkleur rood/groen, bloeitijd is juni-okt
- Wortelstandige bladeren hebben een duidelijke hartvormige voet, de hogere bladeren zijn spiesvormig, en iets gegolfd aan de randen

# Senecio vulgaris

## Klein Kruiskruid



- Een tot 50 cm hoge plant
- Langwerpig veerdelig en diep ingesneden blad, gekroesd, met getande slippen en hebben een enigszins omgerolde bladrand
- Bloem: smalle rechte en relatief hoge hoofdjes met alleen gele buisbloemen, bloeitijd jan -dec

# Solanum nigrum

## Zwarte Nachtschade



- Bloeiwijze witte kroonbladeren met gele helmknop die stijf tegen de stijl aanzit, bloemen in een tros en bloeitijd juni-okt
- Eironde bladeren, in een wigvorm naar de steel aflopende voet, bladrand varieert van gaaf tot gelobd of getand
- Pionier plant hoogte tot 60 cm

# Sonchus arvensis

## Akkermelkdistel



- Overblijvend onkruid, hoogte 30-150 cm, witte melksap bij beschadigen blad en stengel
- Blad langwerpig, diep-veerspletig. Bij de stengel aanliggende oortjes, en hebben driehoekige lobben
- Gele bloemhoofdjes, bloeitijd juni tot aan de herfst

# Stellaria media

## Vogelmuur



- Ronde stengel met een rij haren op de steel, kan rood of groen zijn, eenjarig plantje hoogte 10-40 cm
- Tegenoverstaand blad, groen, eirond met een spitse top en vaak gesteeld
- Bloemen hebben 5 kroonbladen, wit, en zeer diep ingesneden, waardoor het lijkt of dat het er 10 zijn

# Tanacetum vulgare

## Boerenwormkruid



- Overblijvende plant, hoogte 60-120 cm
- Bloem: gele dicht op elkaar staande, op knoopjes lijkende hoofdjes, met alleen buisvormige bloemen allen boven in de tuilvormige bloeiwijze direct op, bloeitijd juli-sept
- Bladeren zijn veerdelig ingesneden en tussen de veren zitten nog kleine bladdeeltjes, de bladslippen hebben een gezaagde rand en eindigen in een spits

# Taraxacum officinale

## Paardebloem



- Een plant met een penwortel, hoogte 5-40 cm, de holle stengels bevatten melksappen
- De bloemen bevatten honderden lintbloemen, geel van kleur, bloeitijd april - dec
- Bladeren zijn lijnlancetvormig, waarbij ze vaak veerspletig tot veerdelig zijn ingesneden of getand

# Trifolium repens

## Witte Klaver



- Stengels kruipen over de bodem en wortels ontstaan aan de knopen, hoogte 5-25 cm
- Ronde tot eironde deelblaadjes veelal 3-tallig, aan de top ingedrukt, in het midden zit een lichte V-vormige of halve maanvormige vlek
- Bolvormige bloeiwijze met veel witte vlinderbloemen, bloeitijd mei-okt

# Urtica dioica

## Grote Brandnetel



- Meerjarige plant, hoogte tot 2,5 m, vierkante stengel
- Bladeren zijn gezaagd, eirond tot driehoekig langwerpig bezet met brandharen
- Mannelijke bloemen zijn gelig van kleur, de vrouwelijke zijn een soort pluim en groenig van kleur, bloeitijd juni-okt



# einde presentatie