

# **IBS Plant**

## **lijst 7 | wilde flora**

**Hovenier niveau 3 BOL-BBL**  
**Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL**



# Inhoud



## WILDE FLORA OF INHEEMSE FLORA | alleen Nederlandse naam kennen

Geslachtsnaam	soortnaam	Variatie	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Aegopodium	podagraria			Zevenblad
2 Alliaria	petiolata			Look zonder Look
3 Anthriscus	sylvestris		bosbewonend	Fluitenkruid
4 Bellis	perennis		overblijvend	Madeliefje of meizoentje
5 Capsella	bursa-pastoris		pastoorstas	Herderstasje
6 Cardamine	hirsuta			Kleine Veldkers
7 Cardamine	pratensis		in weiden groeiend	Pinksterbloem
8 Cerastium	fontanum			Gewone Hoornbloem
9 Chelidonium	majus		groter	Stinkende Gouwe
10 Leucanthemum	vulgare		gewoon	Gewone Margriet
11 Elytrigia	repens		kruipend	Kweek
12 Galinsoga	parviflora		kleinbloemig	Kaal Knopkruid
13 Geum	urbanum			Gewoon Nagelkruid
14 Lamium	purpureum		purperkleurig	Paarse Dovenetel
15 Rumex	acetosa			Veldzuring
16 Veronica	filiformis		draadvormig	Draadereprijs

# Aegopodium podagraria

## Zevenblad



- 60 – 90 cm hoge, sterk woekeraar, kruidachtige plant
- Typische samengestelde bladeren 3, 5 of 7 tot wel 9 brede eironde deelblaadjes
- Samengestelde schermen bestaan uit 10 – 20 schermpjes, witte bloemetjes, bloeitijd mei - juli



# Alliaria petiolata

Look zonder look



- Tot 1 m hoge kruisbloemige kruidachtige plant, met rechtopstaande stengels
- Frisgroene redelijk grote hartvormige bladeren, met onregelmatige getande bladrand, na wrijven ruikt ie naar knoflook
- Trossen van viertallige witte bloemen, na de bloei krijgt ie typische lange hauwen, bloeitijd april - juni



# Anthriscus sylvestris

## Fluitenkruid

sylvestris = bosbewonend



- 60 – 150 cm hoge schermbloemige kruidachtige plant, stengels zijn hol en gegroefd, vaak rood bewaasd
- Fijn verdeelde bladeren, zijn twee- tot drievoudig geveerd, onderzijde zachtbehaard
- De bloemen staan gegroepeerd in schermpjes deze vormen samen met elkaar een groot scherm, bloeitijd april – juni, november – december



# Bellis perennis

## Madeliefje / Meizoentje

perennis = overblijvend



- Een van de meest bekende bloeiende plant, hoogte 5 tot 15 cm rozetvormende plant
- De bladeren zijn spatelvormend, behaard en 5 cm groot
- De bloemen zijn composietbloemen, witte lintbloemen waarvan de randen soms rood tot paars kleuren, bloeitijd febr. – oktober



# Capsella bursa-pastoris

## Herderstasje

bursa-pastoris = pastoorstasje



- Een 5 – 60 cm hoge kruisbloemige rozetvormende plant
- Het blad is lancetvormig tot wat breder en met een bijna gave rand tot sterk veerdelig
- Bloeiwijze is een langgerekte tros, bloeit wit, de vruchten zijn karakteristiek, lang gesteeld, afgeplat en driehoekig of hartvormig, bloeitijd maart – dec.

# Cardamine hirsuta

## Kleine Veldkers



- Een 5 tot 30 cm hoge polvormende groeiwijze door het grote aantal bladeren dat in een rozet staan
- Bladeren zijn onevengeveerd, de blaadjes hebben de vorm van een ruit, het blad aan de top is het grootst, de rand is gaaf soms wat gelobd
- Trosvormige bloeiwijze met kleine witte bloemen, vruchten zijn relatief lang en smal, bij aanraking springen ze open. Bloeitijd febr. – juni



# Cardamine pratensis

## Pinksterbloem

pratensis = in weiden groeiend



- 15 – 50 cm hoge kruidachtige plant
- Aan de rolronde tot iets kantige holle en gladde stengels vind je veerdelige bladeren waarbij de 4 – 7 parige deelblaadjes lijnvormig tot elliptisch zijn, bladrand is gaaf
- Trosvormige bloeiwijze, prachtige licht- lila tot roze of paarse bloemen, met fraaie adering, bloeitijd april – juni

# Cerastium fontanum

## Gewone Hoornbloem




- Een 4 – 45 cm plant met recht opstaande stengels, uit de anjerachtige familie
- Stengelleden zijn paarsig van kleur, lancetvormige bladeren, gaafrandig, bladstand tegenoverstaand en behaard
- Witte bloemen bloeiend in april – sept. , doosvruchten zijn 8 – 11 mm lang.



# Chelidonium majus

## Stinkende Gouwe

majus = groter



- Een 60 – 90 cm hoge plant behorend tot de papaverfamilie, kenmerkend voor de plant is de oranje-geel melksap
- Opvallende bladeren, enigszins blauw van kleur, ze zijn oneven geveerd of diep veerdelig en de top is drielobbig, bladrand is gekarteld
- Heldergele bloemen, 2 – 6 bij elkaar in een scherm, bloeitijd april – november

# Leucanthemum vulgare

## Gewone Margriet

vulgare = gewoon



- Een 30 – 60 cm hoge plant uit de composietfamilie
- Bladeren zijn spatelvormig en lopen wigvormig versmald in een steel, zijn gekarteld met afgeronde tanden
- Bloemen staan op een hoge steel, ze hebben witte lintbloemen en gele buisbloemen, bloeitijd mei – aug.



# Elytriga repens

## Kweek

repens = kruipend



- Een 30 – 120 cm hoge grassoort met lange taaie witte wortelstokken, daardoor moeilijk weg te krijgen
- Groenblauwe tot grijsblauwe kleur, bladstand: in 2 rijen, lijnvormige bladvorm en een gave bladrand
- Bloeiwijze is een rechtopgaande stijve en onvertakte aar, bloeitijd juni – augustus

# Galinsoga parviflora

## Kaal Knopkruid

parviflora = kleinbloemig



- 15 – 60 cm hoog, behorend tot de composietbloemige, eenjarig pionierssoort
- De ongedeelde bladeren staan tegenover elkaar en hebben een getande bladrand, de rand is bezet met wat vrijstaande rechte haartjes
- De bloem heeft 5 lintbloemen in de hoofdjes, deze zijn drietandig, in het midden staan gele buisbloemen, bloeitijd juni – okt.



# Geum urbanum

## Gewoon nagelkruid



- Een 30 – 60 cm hoge kruidachtige plant
- Stengels en bladeren zijn afstaand behaard die oneven- en afgebroken geveerd zijn, met een grote niervormige middenlob, bladrand gezaagd
- Alleenstaande gele bloemen, deze staat rechtop, aan de bloembodem vindt je niet alleen 5 kelkbladen maar ook kleinere tussen kelkslippen, bloeitijd mei – sept.

# Lamium purpureum

## Paarse dovenetel

purpureum = purperkleurig



- Een 10 – 30 cm hoge plantje met vierkante stengels
- De bladeren staan KTO en zijn regelmatig gekarteld, onderste stengelbladeren zijn eirond tot driehoekig, de hogere bladeren zijn langer dan breed, eirond of ruitvormig, kunnen paarsig aanlopen
- De roodpaarse lipbloemen steken schuin omhoog, bloeitijd maart – oktober



# Rumex acetosa

## Veldzuring



- Een 50 – 100 cm rechtopgaande plant.
- De bladeren zijn veernervig verspreid aangehecht, de pijlvormige bladeren onderaan de stengel hebben een steel, bovenaan de stengel zijn ze vrijwel stengel omvattend
- In de oksels van deze bladeren tref je de bloeitakken aan met hun bloemtrossen, meestal kleurt de bloeiwijze rood maar soms vind je ook witachtige groene bloeiwijze, bloeitijd mei - juni

# Veronica filiformis

## Draadereprijs

filiformis = draadvormig



- Een 5 – 20 cm, meerjarige, overblijvende plant, de stengels zijn rolrond, behaard, kunnen rood aanlopen
- De tegenoverstaande bladeren zijn rond tot niervormig en hebben een gekartelde rand
- Bloemen hebben draaddunne stelen en steken boven de liggende planten uit, ze zijn ongeveer 1 cm groot, de kleur is hemelsblauw maar het kleinste, meestal het onderste kroonblad, is vrijwel wit, bloeitijd april – mei.





# einde presentatie