

IBS Plant

lijst 6 | heesters

Hovenier niveau 2 BOL-BBL



Inhoud



HEESTERS

Geslachtsnaam	soortnaam	vertaling soortnaam	Nederlandse Naam
1 Acer	palmatum	= palmachtig	Japanse Esdoorn
2 Berberis	verruculosa	= wrattig	een Zuurbes
3 Cornus	alba cv.		een Kornoelje
4 Cornus	sericea		een Kornoelje
5 Corylus	avellana 'Contorta'		Kronkelhazelaar
6 Cytisus	praecox cv.	= vroegbloeiend	Brem
7 Elaeagnus	pungens 'Maculata'		Bonte Olijfwilg
8 Hamamelis	mollis	= zacht behaard	Toverhazelaar
9 Hedera	helix 'Arborescens'		Bloeiende Klimop
10 Hypericum	calycinum	= kelkachtig	Hertshooi
11 Ilex	aquifolium cv.		Bonte Hulst
12 Lonicera	nidida cv.	= glanzend	Chinese Kamperfoelie
13 Nandina	domestica		Hemelse Bamboe
14 Prunus	laurocerasus cv.	= laurierkers	Laurierkers
15 Rhododendron	'Praecox'	= vroegbloeiend	Rododendron
16 Rhus	typhina		Fluweelboom
17 Salix	caprea cv.		Treurwilg
18 Viburnum	davidii		Dwerg Sneeuwbal
19 Viburnum	rhytidophyllum	= gerimpeld blad	Rimpel Sneeuwbal

Acer palmatum

Japanse Esdoorn

palmatum = palmachtig



- Meestal struikvormige groeiend, 3-6 m
- Handvormig blad, 5-7 lobbig, ingesneden tot over de helft, fijn gezaagd, lobben sterk toegespitst
- Jonge twijgen, eerst groen, later rood getint, knoppen spits, bruingroen

Acer palmatum

Japanse Esdoorn

palmatum = palmachtig



- Bloemen (mei), purperrood in openstaande tuilen
- Vruchten klein (2 cm) en rond, vleugels vormen een stompe hoek, lichtrood, opstaand of hangend
- Herfstkleur geel tot rood

Berberis verruculosa

een Zuurbes



- Een bolronde, veel gekweekte, winterharde soort, hoogte 1-2 m
- Blad, 1-2,5 cm lang, rand met 2-4 stekelige tanden, eirond, bovenzijde glanzend donkergroen
- Jonge twijgen rond, geelbruin, bladdoorns geel, 3-delig en 1,5 cm lang

Berberis verruculosa

een Zuurbes



- Bloemen (mei-juni) tot 1,5 cm, geel, 1-2 bijeen
- Vruchten 6-8 mm lang, blauwpurper, berijpt
- Zeer geschikt voor vakbeplanting

Cornus alba cv.

een Kornoelje



- Een tot 4 m hoge struik, breed uitgroeiend
- Blad 4-10 cm lang, eivormig met een kort toegespitste top, ongeveer 6 paar nerven
- Opgaande bruinrode twijgen, knoppen vaak gesteeld, sterk aan liggend

Cornus alba cv.

een Kornoelje



- Bloemen (mei-juni) geel-wit in brede, vrijwel vlakke tuilen
- Bessen 6-8 mm in doorsnede, wit of blauwachtig
- Vooral in de winter opvallende rode twijgen

Cornus sericea

een Kornoelje



- Breed uitgroeiende, circa 2 m hoge struik
- Blad ovaal, met een spitse top, 6 - 12 cm lang, 5 - 7 paar zijnerf, bovenzijde donkergroen
- Knoppen en bladmerk donkerbruin

Cornus sericea

een Kornoelje



- Bloemen (mei-juni) geel-wit in brede tuilen
- Vruchten rond, blauw-wit, circa 5 mm in doorsnede
- Twijgen vooral in de winter glanzend groengeel

Corylus avellana 'Contorta'

Kronkelhazelaar



- Een schilderachtige struik met kronkelige twijgen, hoogte 150-200 cm
- Blad rond-ovaal, 7-14 cm lang, top toegespitst, voet hartvormig dubbel gezaagde bladrand
- Jonge twijgen lichtbruin, dicht behaard en bezet met kliertjes

Corylus avellana 'Contorta'

Kronkelhazelaar



- Mannelijke bloemen (jan-maart) aan gele-bruingele, 4-7 cm lange katjes
- Vrouwelijke bloemen eivormig, bruin, met uitstekende rode stijlen
- Eén tot vier eivormige noten bijeen, circa 2 cm lang eerst witgroen later bruin (sept), het bekervormige vruchtomhulsel diep ingesneden, vrijwel even lang als de noot

Cytisus praecox cv.

Brem

praecox = vroegbloeiend



- Een voorjaarsbrem, bossig, opgaand groeiend, 1,5-2 m hoog
- Blad meestal enkelvoudig, zijdeachtig behaard, langwerpig tot spatelvormig
- Jonge twijgen heldergroen, later wat grijsgroen, iets of wat gegroefd, knoppen verscholen achter bladkussen

Cytisus praecox cv.

Brem

praecox = vroegbloeiend



- Bloeitijd april-mei
- Bloemen standaard ivoorwit, vlag lichtgeel, zeer talrijk, geurend
- Behaarde peulen en groen van kleur

Elaeagnus pungens 'Maculata'

Bonte Olijwilg



- Een brede, 3-4 m hoge struik
- Blad, leerachtig, eivormig - ovaal, spits, golvend, bovenzijde in het midden lichtgeel, rand glanzend groen, soms geel gevlekt of gestreept
- Onderzijde blad zilverkleurig, jonge twijgen met bruine schubben

Elaeagnus pungens 'Maculata'

Bonte Olijwilg




- De opvallende bloemen verschijnen in het najaar (aug-okt) buitenzijde zilverkleurig, binnenzijde geel
- Twijgen gedoornd
- Vruchten ovaal, aanvankelijk bruin, bij rijping (volgend jaar mei) lichtrood.

Hamamelis mollis

een Toverhazelaar

mollis = zacht



- Een forse, breed uitgroeiende tot circa 3 m hoge struik
- Bladeren omgekeerd eirond, 8-15 cm lang, asymmetrisch, bochtig getand
- Aanvankelijk aan beide zijde wollig, viltig behaard, later kaal aan de bovenzijde de onderzijde blijft viltig met duidelijk lichte nerven

Hamamelis mollis

een Toverhazelaar

mollis = zacht



- Twijgen viltig, lichtbruin behaard, naakte knoppen
- Bloeitijd december-januari, goudgeel
- Bloemen zijn goudgeel, kroonbladeren 15-17 mm lang, iets gegolfd, kelk is bruin, aangename geur

Hedera helix 'Arborescens'

Bloeiende Klimop



- Een opgaande (niet klimmende) bolvormige struik, hoogte 150 cm
- Bladeren donkergroen, niet gelobd
- Vaak met witachtige nervatuur

Hedera helix 'Arborescens'

Bloeiende Klimop



- Twijgen geelbruin
- Bloemen (sept-okt), geelgroen in kleine trossen bij elkaar
- Vruchten aanvankelijk groen, in het vroege voorjaar zwart wordend

Hypericum calycinum

Hertshooi

calycinum = kelkachtig



- Een liggend uitstoelend, 20-30 hoog struikje
- blad, dik, blauwgroen, 3-8 cm lang, eirond-langwerpig, bladrand is gaaf
- Twijgen rond en bruin

Hypericum calycinum

Hertshooi

calycinum = kelkachtig



- Bloemen (juli-sept) meestal alleenstaand, goudgeel van kleur, zeer opvallende meeldraden
- Openspringende doosvrucht, knikkend
- Een uitstekende bodembedekker

Ilex aquifolium cv.

Bonte Hulst



- Een tot 8 m hoge struik of boom met een brede piramidale kroon
- Blad, de bladrand is egaal wit en regelmatig bochtig, scherp getand, leerachtig eirond-ovaal
- Twijgen kaal, donker- of lichtgroen

Ilex aquifolium cv.

Bonte Hulst



- Bloemen (mei-juni) wit
- Bloemen meestal 4-tallig, in bundels geplaatst okselstandig
- Vrucht kogelvormig tot licht eivormig, koraalrood, rijpend in september

Lonicera nitida cv.

Chinese Kamperfoelie

nitida = glanzend



- Opgaande groeiende 1-2 m hoge struik
- Bladeren groen blijvend, dun leerachtig, eirond - langwerpig, bovenzijde glimmend donkergroen, onderzijde lichter
- Twijgen aanvankelijk purper getint, dicht, blijvend behaard

Lonicera nitida cv.

Chinese Kamperfoelie

nitida = glanzend



- Bloemen (mei-juni) onopvallend, geel-wit, reukloos, paarsgewijs aan kleine zijtwijgen geplaatst
- Bessen weinig voorkomend, glanzend paars
- Wordt vaak in vakbeplantingen toegepast

Nandina domestica

Hemelse Bamboe



- Een tot 2 m hoge wintergroene heester
- Dubbel of drielobbig geveerd blad, lansvormig,
- Blad, rozerood in de lente, groen in de zomer en roodpaars in de herfst

Nandina domestica

Hemelse Bamboe



- Crème witte pluinvormige bloemen
- Bloeitijd is juli-augustus, stervormige bloem
- In de winter helder rode bessen

Prunus laurocerasus cv.

Laurierkers

laurocerasus = laurierkers



- Een forse, brede, opgaande, tot 3 m hoge struik
- Blad is breed-ovaal tot omgekeerd eirond, 13-17 cm lang met een min of meer afgeronde tot plotseling toegespitste top, lichtgroen, zwak glanzend
- Jonge twijgen groen en kaal, later donkerder, knoppen groen

Prunus laurocerasus cv.

Laurierkers

laurocerasus = laurierkers



- Opstaande, witte bloemtrossen (mei)
- Vruchten circa 1 cm lang, zwartrood tot zwart van kleur
- Toepassing in grote beplantingsgroepen, hoge hagen

Rhododendron 'Praecox'

Rhododendron

praecox = vroegbloeiend



- Een circa 1 m hoge, losse heester
- Bladeren half wintergroen, ovaal, 5-7 cm lang, bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde beschubd
- Twijgen groen, spaarzaam beschubd

Rhododendron 'Praecox'

Rhododendron

praecox = vroegbloeiend



- Rijkbloeiende struik, meestal solitair gebruikt
- Bloemen (maart-april)
- Bloemen lila-roze, tot 4 cm breed, 2-3 bijeen aan het einde van de twijgen

Rhus typhina

Fluweelboom



- Een tot 5 m hoge struik- of meerstammig boompje en een brede kroon
- Bladeren 20-30 cm lang, geveerd, 11-31 blaadjes, 5-11 cm lang, eivormig-langwerpig, scherp gezaagd
- Jonge twijgen dicht, aanvankelijk rood, later bruin behaard, knoppen door een hoefijzervormig bladmerk

Rhus typhina

Fluweelboom



- Bloemen (juni-juli) groenachtig in dichte 15-20 cm lange pluimen
- Vruchtkolven rood, dichtbehaard en zeer lang aanblijvend
- Herfstkleur rood-oranje

Salix caprea cv.

Treurwilg



- Een prieelvormig, op stam geënt treurwilgje, hoogte divers
- Bladeren zeer variabel, breed-ovaal, tot 10 cm lang, bovenzijde iets ruw, matgroen, min of meer viltig behaard, netvormig geaderd, bladrand zwak gezaagd, gegolfd of gaafrandig, top naar achter gebogen
- Twijgen vrij dik, donkerbruin, kaal, glanzend, knoppen rood-geelgroen, iets afstaand, ongeveer 6 mm lang

Salix caprea cv.

Treurwilg



- Bloemen (maart-april) vrouwelijke katjes met gesteelde viltig behaarde vruchtbeginsels, uiteindelijk tot 7 cm lang
- Mannelijke katjes dik en eivormig, tot 4 cm, zilvergrijs met goudgele helmhokjes

Viburnum davidii

Dwergsneeuwbal



- Een gedrongen tot ongeveer 50 cm hoge, breed uitgroeiende struik
- Bladeren wintergroen, ovaal tot omgekeerd eirond, 5-12 cm, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter, driennervig, gaafrandig
- Twijgen groen, kaal met wratten bezet

Viburnum davidii

Dwergsneeuwbal



- Bloemen (mei-juni) roze–wit in tot 8 cm brede, meestal 7-stralige tuilen
- Vruchten eirond, staalblauw, tot 6 mm lang, opvallend lang aanblijvend

Viburnum rhytidophyllum

Rimpel Sneeuwbal

rhytidophyllum = gerimpeld blad



- Een 3-4 m hoge, opgaande struik
- Bladeren wintergroen, langwerpig, vrijwel gaafrandig, bovenzijde glanzend donkergroen en rimpelig, onderzijde grijs tot geelachtig viltig
- Twijgen dik, lichtbruin, aanvankelijk sterharig viltig

Viburnum rhytidophyllum

Rimpel Sneeuwbal

rhytidophyllum = gerimpeld blad



- Naakte of bedekte knoppen
- Bloemen in het najaar aangelegd (mei-juni) geelachtig wit, in 10-20 cm brede tuilen
- Vruchten ovaal-rond, 8 mm aanvankelijk glanzend rood, later zwart



einde presentatie

10-11-2023 Tuin- en landschapsinrichting

Yuverta