

Infectieuze diarree

Infectie door bacterie, virus of parasiet

Verschijnselen

- *Koorts*
- *Lusteloos*
- *Slechte drinklust*
- *Vermagering en uitdrogingsverschijnselen*
- *Bijverschijnselen zoals gewrichts-, long- of hersenvliesontsteking*
- *Kalveren persen*

Oorzaak

- *Bacterie*
 - E-coli van 0 – 10 dagen
- *Virus*
 - Rota en Coronavirus in de 2e en 3e week
- *Parasiet*
 - Coccidiosis vanaf de 3e week
- *Overig*
 - paratyphus, cryptosporidium, bovine virusdiarree

Behandeling

- *Zoek oorzaak van de infectie*
 - mest- of bloedonderzoek
- *Voorkom besmetting van andere kalveren*
 - reinigen huisvesting, kalveren afzonderen
- *Elektrolytenmix*
 - 1^{ste} en 2^{de} voeding
 - daarna weer met een beperkte hoeveelheid melk en tussentijds elektrolyten
- *Verstrek vitaminen en mineralen*

Behandeling bij bacterie

- *Antibioticumkuur*
- *Verstrek elektrolyten in plaats van melk*
- *Of verstrek elektrolyten tussen de melkbeurten door*

Behandeling bij virus

- *Eventueel antibiotica tegen secundaire (bacteriële) infecties*
- *Zorg voor een goed klimaat en juiste huisvesting*
- *Sluit IBR en BVD uit door middel van bloedonderzoek*

Behandeling bij parasiet

- *Neem de oorzaak van de besmetting weg (bijvoorbeeld besmet voer)*
- *Afhankelijk van de ernst → antibiotica*