

## Jongvee met Mortellaro loopt risico op latere leeftijd

22-10-2012

**Runderen die op jonge leeftijd te maken krijgen met digitale dermatitis (ziekte van Mortellaro), lopen een verhoogd risico om de aandoening na afkalven nogmaals te krijgen.**

Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), die gedurende twee jaar praktijkonderzoek deed naar klauwaandoeningen bij jongvee. Het onderzoek werd gehouden op vijf bedrijven met en vijf bedrijven zonder weidegang. De dieren zijn voor het onderzoek vier keer per jaar in de klauwbekapbox beoordeeld.

Digitale dermatitis kwam nauwelijks voor bij jongvee jonger dan één jaar. Daarnaast was de aandoening significant minder aanwezig op bedrijven met weidegang. Uit het onderzoek bleek dat de aanwezigheid van digitale dermatitis op jonge leeftijd het risico op de ziekte na afkalven vergrootte.

### **Minder klauwaandoeningen met weidegang**

In tegenstelling tot digitale dermatitis was stinkpoot al wel meer aanwezig onder jongvee. Vooral in het tweede levensjaar en na afkalven nam het aantal dieren met stinkpoot toe. Ook hier werd een relatie gevonden met doorgemaakte stinkpoot op jongere leeftijd. Op de bedrijven met weidegang liep het aantal klauwaandoeningen tijdens de weideperiode terug. Weidegang had geen effect op het voorkomen van zoolbloedingen.

### **Ontsmettingsbak bij jongveestal**

Volgens de GD is het verstandig om aparte laarzen te gebruiken en een ontsmettingsbak bij de ingang van de jongveestal te plaatsen om te voorkomen dat klauwaandoeningen worden overgebracht naar het jongvee. De GD raadt het huisvesten van jongvee samen met droge koeien af, dit vergroot de kans op klauwproblemen na afkalven aanzienlijk.

*Jongvee met klauwproblemen heeft verhoogd risico op klauwaandoeningen na afkalven .*

