

## **Klauwtip Jongvee (1): Gezondheid**

**Voorkom te lange klauwen bij uw jongvee en reageer snel bij Mortellaro.**

### **> relatie gezondheidsproblemen en klauwgezondheid onbekend**

De invloed van gezondheidsproblemen tijdens de eerste maanden van de opfok op de klauwgezondheid is niet bekend.

### **> voorkom mechanische beschadiging**

Wanneer het jongvee na 5 á 6 maanden van stro naar roosters gaat zijn de klauwen vaak te lang. Dit kan een eerste mechanische beschadiging aan de klauw opleveren. Als de klauwen erg lang zijn, kort ze dan in met een tang of plaats de dieren eerder op de roosters.

### **> reageer snel bij Mortellaro**

Neem direct maatregelen wanneer uw jongvee Mortellaro heeft. Vanaf een leeftijd van 14 maanden is de kans op Mortellaro groter. Heeft één pink Mortellaro? Behandel deze dan direct individueel. Zo houdt u de infectiedruk in de koppel laag. Is er een uitbraak van Mortellaro? Gebruik dan een voetenbad. Ook kunt u de dieren vastzetten aan het voerhek en behandelen met de rugspuit.

### **> voorkom problemen door Mortellaro**

Bekap de vaarzen voor het afkalven bij flinke Mortellaro infecties. Een gevolg van Mortellaro is dat er meer hoornvorming plaatsvindt in de balgedeeltes van de klauwen. Hierdoor kunnen zoolzweren of witte lijn aandoeningen zich ontwikkelen voor of na het afkalven. Door de dieren voor het kalven te bekappen voorkomt u problemen in de eerste maanden na afkalven.

