

Klauwtip jongvee (3): Huisvesting

Hygiëne, ventilatie en de juiste afmetingen van voerhek en ligboxen zijn belangrijk in de preventie van klauwproblemen bij uw jongvee.

Huisvesting speelt een rol in de preventie van klauwproblemen. In eerste instantie zijn hygiëne en ventilatie belangrijke factoren.

> Zorg voor een schone, droge omgeving

Met droge, mestvrije roosters kunt u infectieuze klauwaandoeningen, zoals stinkpoot en Mortellaro voorkomen. Een rantsoen met voldoende structuur levert hier ook een bijdrage aan. Een goede ventilatie van de stal zorgt ervoor dat de roosters droger zijn.

> Voerhek voldoende hoog

Voorkom vergroeien van de klauwen door het voerhek voldoende hoog te plaatsen. Bij een te laag voerhek zet uw jongvee meer druk op de binnenklauwen van de voorbenen. Het gevolg is een overmatige hoornvorming in de teen van de binnenklauw en later ook in het balgedeelte. In een verder stadium zal, afhankelijk van de genetische klauwvorm, de teen van de binnenklauw over de teen van de buitenklauw groeien. De overmatige hoorngroei leidt tot zoolzweren of witte lijn defecten.

> Voorkom belemmeringen bij opstaan

Zorg voor een juiste boxafmeting en –bedekking. Zo kan uw jongvee goed en in één keer opstaan. Daarnaast voorkomt u dat er mechanische beschadigingen van de klauwen optreden bij het opstaan. Veel belemmeringen bij het opstaan van uw jongvee kan daarnaast ook leiden tot dikke hakken.