

# Heesters

Periode 2

20-7-2022 Onderwerp van de presentatie



# Handelsmaten



**Kale wortels**  
Planten half november  
t/m maart



**Met kluit**  
Planten half november  
t/m april



**In container**  
Planten het hele jaar  
(mits het niet vriest)

- Vertakking, bv 2, 3/4, 5/7, 8/12
- Hoogte (bij opgaande heesters) in cm, b.v. 60-80, 80-100
- Breedte (bij kruipende heesters) b.v. 30-40
- "Leverbaar" bij heesters welke elk jaar afgezet worden

**Yuverta**

Geslachtsnaam	Soortaanuiding	(Cultuur)varieteit	Nederlandse naam
<b>Acer</b>	palmatum		Japanse Esdoorn
<b>Aucuba</b>	japonica	'Variegata'	Japanse Broodboom
<b>Berberis</b>	stenophylla		Zuurbes
<b>Berberis</b>	julianae		Zuurbes
<b>Berberis</b>	thunbergii		Zuurbes
<b>Buxus</b>	sempervirens		Palomboompje/Buxus
<b>Camellia</b>	japonica		Japanse Roos
<b>Chaenomeles</b>	japonica	cv.	Japanse Sierkwee
<b>Cornus</b>	alba	'Sibirica'	Rode Kornoelje
<b>Cornus</b>	mas		Gele Kornoelje
<b>Cotoneaster</b>	suecicus		Dwergmispel
<b>Cytisus</b>	scoparius		Bezembrem
<b>Erica</b>	carnea		Dopheide
<b>Euonymus</b>	fortunei	'Vegetus'	Kardinaalsmuts
<b>Hibiscus</b>	syriacus		Tuinhibiscus
<b>Hedera</b>	helix	'Arborescens'	Klimop
<b>Hippophae</b>	rhamnoides		Duindoorn
<b>Ilex</b>	aquifolium		Scherpe Hulst
<b>Kolkwitzia</b>	amabilis		Koninginnestruik
<b>Lavandula</b>	angustifolia		Lavendel
<b>Lonicera</b>	nitida		Struikkamperfoelie
<b>Mahonia</b>	aquifolium		Mahoniestruik
<b>Photinia</b>	fraseri	'Red Robin'	Glansmispel
<b>Prunus</b>	laurocerasus		Laurierkers
<b>Spiraea</b>	cinerea	'Grefsheim'	Spierstruik
<b>Skimmia</b>	japonica		Skimmia
<b>Symphoricarpos</b>	albus	laevigatus	Sneeuwbes
<b>Syringa</b>	vulgaris		Sering
<b>Viburnum</b>	tinus		Sneeuwbal



Yuverta


# Acer palmatum



4 Onderwerp van de presentatie

- 3-6 m hoog
- Twijgen glanzend groen, later zonzijde rood getint
- Eindknop vaak met tweeën bij elkaar
- Bladeren 5-7 lobbig, herfstkleur opvallend geel tot rood
- Staat niet graag in de volle zon, in de wind of op zware grond


## Aucuba japonica 'Variegata'



Yuverta

- 2-3 m hoog
- Groenblijvende struik met leerachtige, glanzende, overstaande bladeren. Bladeren 9-20 cm lang met spitse top en bladrand met weid uitstaande tanden. Bladeren bont gevlekt.
- Bessen rood (let op. 'Variegata' is vrouwelijk. Voor bessen moet er ook een mannelijke plant in de buurt staan)
- Staat graag een beetje beschut en niet te droog. Hij stelt verder weinig eisen en kan tegen schaduw.



## Berberis stenophylla



Yuverta


- Kan 2 tot 3 meter hoog worden
- Dunne overhangende behaarde twijgen, stekels drietallig
- Bloemen in trossen, goudgeel tot oranje in mei
- Wintergroen met zeer smalle, ingerolde bladeren
- Staat het liefst dus op humusrijke zandgrond.  
Halfschaduw wordt vaak verdragen.

## Berberis julianae



- 2 tot 3 m hoog
- Bladeren getand, variabel in grootte, wintergroen
- Stekels driedelig, 1 tot 4 cm lang
- Vooral toegepast in grootschalige groenprojecten als haag / barrière
- Staat het liefst dus op humusrijke zandgrond. Halfschaduw wordt vaak verdragen.

## Berberis thunbergii



- 0,5 tot 1,5 m hoog
- Twijgen met 1 stekel
- Bladeren zomergroen, spatelvormig, bovenzijde groen, onderzijde grijsgroen. Herfstkleur
- Vruchten rood, ellipsvormig
- Bloemen heldergeel, mei
- Staat het liefst dus op humusrijke zandgrond. Halfschaduw wordt vaak verdragen.





## Buxus sempervirens



Yuverta


- Kan 3 tot 6 m hoog worden maar wordt bijna altijd in vorm gesnoeid
- Twijgen groen, iets kantig
- Bladeren wintergroen, tegenoverstaand, leerachtig aan de top iets ingerand
- Staat graag op een humus houdende zandgrond. Doet het prima in de schaduw.
- Heeft sinds een aantal jaren veel last van de Buxusmot

## Camellia japonica




- Struik- tot boomvormer, kan tot 5 m hoog worden
- Bladeren groenblijvend, leerachtig
- Alleenstaande bloemen, tot 5 cm breed in de oksels van de bladeren. Enkelvoudig tot gevuld, wit, roze, oranje, rood. Bloei van november tot april, meestal erg vroeg in het jaar!
- Staat graag op een wat zuurdere grond, niet te droog.
- Zet hem beschut, niet in de ochtend zon. Dan kunnen de bloemen snel beschadigen na nachtvorst

## Chaenomeles japonica (cultivars)




- 0,5 tot 1 m hoge breed groeiende heester
- Twijgen bruingeel met fijne doorns
- Bloeit in maart-april met geel, oranje of rode bloemen aan kortloten (bloei vaak binnenin de plant waardoor ze niet altijd goed zichtbaar zijn)
- Vruchten 3-4 cm grote, geelgroene 'appeltjes'. Blijven lang aan de plant zitten
- Bladeren 3-5 cm ovaal-eirond
- Kan overal staan maar liefst wel in de zon

## Cornus alba 'Siberica'



- Ongesnoeid tot 4 m hoog. Jaarlijks gesnoeid tot 1,5 m hoog
- Twijgen helder rood van kleur
- Bladeren 4-10 cm lang, eivormig, kort toegespitst, onderzijde blauwgroen. Rode herfstkleur
- Staat graag op een kalkarme grond, graag in de zon maar kan ook in de schaduw (let op met snoeien, voor uitlopen heeft de Cornus wel zon nodig)

## Cornus mas




- Tot 5 m hoog
- bloeit in februari-maart op het kale hout met goudgele bloemen in kleine schermen
- Twijgen groen
- Bloemknoppen rond en gesteeld
- Geen bijzondere eisen aan de standplaats

## Cotoneaster x suecicus




- Breed uitgroeierende bodembedekker, 0,4 tot 0,6 m hoog
- Bloemen wit in mei-juni
- Vruchten scharlakenrood
- Blaadjes 1-2 cm, wintergroen, onderzijde witachtig
- Stelt weinig eisen aan de bodem. Let wel, hoe meer zon, hoe meer bessen.

## Cytisus scoparius



- 1,5 tot 2 m maar dient regelmatig gesnoeid te worden. Blijft dan een stuk lager.
- Bloeit in mei –juni met gele, oranje of rode, okselstandige bloemen.
- Blaadjes klein, handvormig samengesteld, drietallig (bij *C. praecox* enkelvoudig)
- Staat graag op voedselarme zandgrond (op voedselrijkere grond groeit blijft hij minder compact)

## Erica carnea



Yuverta

- Max 0,3 m hoog
- Naaldvormige blaadjes in kransen van 4
- Bloemen urnvormig, met bruine uitstekende meeldraden. Bloeit in februari-april.
- Erica staat graag op een zure humusrijke grond, E. carnea kan ook enigszins kalk verdragen




## Euonymus fortunei 'Vegetus'



Yuverta

- +/- 1 m hoog
- Breed groeiend, kan ook klimmen (vormt tegen muren hechtwortels)
- Bladeren breed, eirond effen groen met een gezaagde bladrand
- Bloemen onopvallend, kan wel in het najaar opvallende vruchten dragen
- Staat graag op een humusrijke, vruchtbare grond. Verdraagt schaduw

## Hibiscus syriacus




- 2-3 m hoog
- Bloemen groot (tot 6 cm breed), meeldraden op de stempel. Wit, rood, roze, violet, dubbel of enkelvoudig.
- Bladeren zomergroen, meestal 3-lobbig
- Twijgen grijs
- Bladmerk driehoekig met 4 sporengroepen
- Loopt laat uit!
- Scheutbloeier (snoeien in het voorjaar)
- Staat graag op een humushoudende niet te natte grond

## Hedera helix 'Arborescens' (*Hedera helix* Arborescent-group)




- 1 – 1,25 m hoog (na 10 jaar)
- Bladeren groen, leerachtig en ruitvormig
- Bloemen groengelig in bolvormige schermen (drachtplant voor bijen)
- Niet kieskeurig wv voedselrijkdom. Verdraagt schaduw goed

## Hippophae rhamnoides





- 2-4 m hoge heester
- Bladeren lancetvormig, grijsgroen
- Twijgen zilverachtig geschubd, gedoornd. Knoppen bruin geschubd
- Bloemen onopvallend maar de twijgen zitten in het najaar vol met oranje bessen
- De bloemen zijn eenslachtig en de plant is eenhuizig
- Kan tegen schrale en droge grond, staat graag in het licht, liefst niet zuur

## Ilex aquifolium



- 8-10 m heester- of boomvormer
- Twijgen licht tot donker groen, kaal
- Bladeren groenblijvend, bovenzijde glanzend, leerachtig. Bladrand in meer of mindere mate scherp getand. Bladeren verspreid
- Planten zijn over het algemeen tweehuizig. De vrouwelijke planten dragen in het najaar tot in de winter rode bessen
- Kan op alle grondsoorten, kan in de schaduw maar staat graag beschut tegen wind.

## Kolkwitzia amabilis



Yuverta

- 3-4 m hoog, bij regelmatige snoei kleiner
- Bladeren tegenoverstaand, eivormig toegespitst, bladrand, nerven en bladsteel behaard
- Twijgen aanvankelijk behaard, later kaal, roodbruin
- Bladmerken met een lijn verbonden
- Roze klokvormige bloemen in mei-juni. Bloemen in trossen aan korte zijtwijgen
- Stelt weinig eisen aan de standplaats. Echter, hoe meer zon, hoe meer bloemen

## Lavandula angustifolia



- Ongesnoeid tot 0,8 m, gesnoeid wat lager
- Bladeren lijnvormig, grijsbehaard en sterk geurend
- Bloemen blauw in eindstandige aren in juni - augustus
- Staat graag wat droog en op een zonnige plaats.

## Lonicera nitida



- Breed opgaand tot 1 tot 2 m hoog
- Bladeren wintergroen, eirond, ong. 1 cm lang. Tegenoverstaand
- Twijgen purper, behaard.
- Stelt niet veel eisen, kan in de (half)schaduw maar liefst in de zon.
- Kan als solitair maar wordt vooral als vakbeplanting, al dan niet geschoren. toegepast




## Mahonia aquifolium



Yuverta

- 1 tot 1,5 m hoog
- Blaadjes dun leerachtig, symmetrisch samengesteld. 5 Tot 9 deelblaadjes. Deelblaadjes getand. In de winter vaak brons verkleurend
- Gele bloeien in trossen, maart-mei
- Stelt weinig eisen aan de standplaats



## Photinia x fraseri 'Red Robin'



Yuverta

- 3-5 m hoog
- Bloemen wit, in brede schermen in mei-juni
- Bladeren ellips tot eivormig, glanzend, 7-9 cm. Bij uitlopen opvallend helder tot donkerrood, in het najaar weer naar rood verkleurend
- Stelt weinig eisen aan de standplaats, kan in de halfschaduw
- Kan last krijgen van bladvlekkenziekte

## Prunus laurocerasus



Yuverta


- 2-4 m hoog
- Bladeren leerachtig, glimmend groen. Wintergroen
- Bloemen wit in okselstandige opstaande aren
- Liefst op een humusrijke grond. Verdraagt schaduw.
- De soort zelf wordt nauwelijks toegepast.

## Spiraea x cinerea 'Grefsheim'




- Tot 1 m hoog
- Bloemen zuiver wit, in kleine schermen langs de twijgen in april-mei
- Twijgen donkerbruin, zeer dun, kantig en overhangend
- Bladeren 2-3 cm, gaafrandig, soms aan de top getand
- Niet veeleisend wat betreft standplaats, wel graag in de zon

## Skimmia japonica



- Tot 1 m hoog
- Bladeren wintergroen
- Bloemen wit, bloeit in april-mei.  
Vrouwelijk: vormt rode bessen welke makkelijk een jaar aan de plant kunnen blijven  
Mannelijk: de cv 'Rubella' heeft opvallend bruinrode bloemknoppen vanaf het najaar
- Staat graag wat droger en in de (half)schaduw, op een wat zure grond. Wanneer de grond te basisch is, worden de bladeren snel gelig.


## Symphoricarpos albus var. laevigatus



overstaande  
bladstelen door een  
lijn verbonden



merg ontbreekt






- 1,5 tot 2 m hoog maar kan jaarlijks teruggezet worden
- Bladeren aan de langloten gelobd
- Bessen wit, 0,5 tot 1 cm doorsnede, zeer talrijk en lang aan de plant blijvend
- Vormt worteluitlopers en kan woekeren
- Groeit bijna overal!

## Syringa vulgaris



- 3-6 m hoge struik (of kleine boom)
- Bloemen in 10-20cm lange pluimen. Bloeit in mei. Bloemen sterk geurend.
- Knoppen groen (cultivars met donkere bloemen), tegenoverstaand met vaak twee eindknoppen.
- Bladeren hartvormig, toegespitst
- Op een zonnige, voedselrijke plaats

## Viburnum tinus



- 2-3,5 m hoog
- Bloemen in ronde schermen, in de knop roze, bloeiend wit. Bloeit van november tot april!
- Bladeren elliptisch, boven donkergroen, onder lichter groen. Wintergroen
- Vruchten donkerblauw
- Standplaats algemeen, liefst in de zon en beschut en niet te nat in de winter
- Niet geheel winterhard