


# Klimplanten

Periode 3


30-1-2023 Onderwerp van de presentatie

Yuverta




	Geslachtsnaam	soortaanduiding	Variatie	Nederlandse Naam
1	Clematis		Montana Group	Bosdruif
2	Hedera	colchica	'Dentata Variegata'	Bonte Klimop
3	Humulus	lupulus		Hop
4	Hydrangea	anomala	petiolaris	Klimhortensia
5	Lonicera	periclymenum	'Belgica Select'	Wilde Kamperfoelie
6	Wisteria	sinensis	'Prolific'	Blauwe Regen

# Clematis



## Montana groep

- > Bloei in het voorjaar
- > Deelblaadjes meestal gezaagd
- > Kroonblaadjes meestal 4
- > Bloemen gemm. < 5 cm
- > Geen schutblaadjes



## Jackmannii groep

- > Bloei in zomer
- > Deelblaadjes meestal gaafrandig
- > Kroonblaadjes 4-6
- > Bloemen gemm. > 5 cm
- > Okselstandige bloemen met schutblaadjes



- Binnen het geslacht Clematis wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de kleinbloemige Clematissen en de grootbloemige Clematissen. In de eerste groep zijn nog veel soorten te vinden, in de tweede groep zitten enkel cultivargroepen en zijn afzonderlijke soorten niet meer terug te vinden. Bij de kleinbloemige Clematissen vinden we de Clematis montana welke samen met een aantal kruisingsproducten van deze soort de montana groep vormen. De Jackmannii groep is een van de ca. 5 groepen van grootbloemige clematissen

## Clematis Montana Group




- Tot 10 m hoog, slingerplant
- Bladeren handvormig samengesteld met 3 blaadjes, deelblaadjes gezaagd
- Bloemen (4-5 cm) met 4(-6) kroonbladeren, bloeit in mei-juni (in het voorjaar op twijgen) Bloeit roze (sommige cv's wit)
- Kan aardig wat schaduw verdragen

## Hedera colchica 'Dentata Variegata'



- Tot 10 m hoog, klimplant (hecht slecht!)
- Bladeren (vegetatief) breed met een enigszins hartvormige voet, (generatief) smaller met een wigvormige voet
- Dentata (heel spaarzaam getand) Variegata Roomwitte bladrand met een groen centrum (van licht- naar donkergroen)
- Stelt niet veel eisen aan de standplaats. Groeit prima in de schaduw (als bodembedekker of tegen een noordmuur).

## Humulus lupulus






- 1 – 5 meter, slingerplant
- Bladeren handvormig gelobd met 3(-5) lobben, bovenzijde ruw
- Bloemen onopvallend, vooral de hopbellen (vruchten) zijn karakteristiek (verschijnen in augustus – september)
- Humulus lupulus is een vaste plant, dat betekent dat hij in de winter boven de grond afsterft.
- Lastig om 'mooi' langs een steun te leiden. Beter toepasbaar als een wat natuurlijke groeier in bv

hekjes e.d.

- Staat graag op een voedselrijke, vochtige grond (niet in kalkrijke zeeklei)

## Hydrangea anomala petiolaris



- 10 m hoog, klimplant
- De scheuten en jonge twijgen zijn roodbruin; later sterk afschilferend en grijs wordend. De scheuten vormen hechtwortels
- De lang gesteelde bladeren zijn eirond met een hartvormige voet; bovenzijde glanzend donkergroen, onderzijde heldergroen bladrand is fijn en scherp gezaagd. Een opvallende, gele herfstkleur
- Grote, vlakke bloemtuilen met onopvallende vruchtbare, wittige bloempjes en een rand grote, witte steriele bloemen (kelkblaadjes); de bruine bloeiwijze blijven lang zichtbaar.
- Staat graag in de schaduw of anders op een voldoende vochtige plaats. Duurt soms even voor hij echt aanslaat en gaat groeien.



# Lonicera



## **Lonicera henryi**

- > Bladeren lancetvormig
- > Twijgen ruw behaard
- > Twijgen gevuld





## **Lonicera periclymenum**

- > Bladeren ovaal
- > Twijgen kaal
- > Twijgen hol



## Lonicera periclymenum 'Belgica select'



- 4 tot 5 m hoog, slingerplant
- Bloemen in eindstandige kransen. Buitenzijde rood (verkleurend naar roze, binnenzijde geelwit. Geurend. Bloeit in juni-augustus
- Vruchten zijn besvormig en rood van kleur
- Bladeren ovaal, donkergroen, onderzijde blauwgroen
- Rijke bloeier. Staat graag in de zon, kan in de halfschaduw. De soort is inheems en vooral te vinden in bosranden.

# Wisteria

## **Wisteria floribunda**

- > Bloemtros 20-50 cm lang
- > Bloei gelijk met bladontluiking
- > Bloemen zwak geurend
- > Aantal deelblaadjes 13-19
- > Met de klok mee windend

## **Wisteria chinensis**

- > Bloemtros 15-30 cm lang
- > Bloei vóór bladontluiking
- > Bloemen sterk geurend
- > Aantal deelblaadjes 9-13 (meestal 11)
- > Tegen de klok in windend



## Wisteria sinensis 'Prolific'



- 10-15 meter hoog, slingerplant
- Bladeren verspreid, oneven geveerd
- Twijgen zijn (linksom) windend. Takken kunnen 'wurg'
- Bloemknoppen opvallend
- Blauwe (geurende) vlinderbloemen in trossen van 20-30 cm in mei (vóór de bladontwikkeling)
- Staat graag op een zonnige plaats