

Heesters

Periode 3

30-1-2023


Yuverta

Geslachtsnaam	Soortaanduiding	Cultivar / varieteit	Nederlandse Naam
1 Amelanchier	lamarckii		Krentenboompjes
2 Berberis	thunbergii	'Atropurpurea'	Japanse Zuurbes
3 Buddleja	davidii	'Empire Blue'	Vlinderstruik
4 Corylus	avellana		Hazelaar
5 Forsythia	intermedia		Chinees Klokje
6 Ligustrum	vulgare		Wilde Liguster
7 Lonicera	nitida		Chinese Kamperfoelie
8 Kerria	japonica		Ranonkelstruik
9 Magnolia	soulangiana		Beverboom
10 Prunus	spinosa		Sleedoorn
11 Prunus	triloba		Amandelboompje
12 Ribes	sanguineum		Rode Ribes
13 Rosa	glauca		Bergroos
14 Rosa	nitida		Glansroos
15 Rosa	rugosa		Bottelroos / Rimpelroos
16 Salix	babylonica		Kronkelwilg
17 Sambucus	nigra		Gewone Vlier
18 Spiraea	vanhouttei		een Spierstruik
19 Spiraea	japonica		een Spierstruik
20 Syringa	vulgaris	'Mme Lemoine'	Witte Sering
21 Viburnum	opulus		Gelderse Roos/Sneeuwbal





Yuveta

Amelanchier lamarckii





- 5-7 m hoog, heester of meerstammige kleine boom
- Bloemen in april, mei. Wit. In losse hangende tuien. Bloeit kort!
- Vruchten eetbaar (als de vogels je niet voor zijn)
- Bladeren ovaal tot omgekeerd eirond. Opvallende oranjerode herfstkleur
- Knoppen spits, rood aangelopen. Twijgen op sommige plekken zilvergrijs
- Verdraagd wat schaduw. Niet te nat (liefst op zandgrond)

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'



- 0,5 tot 1,5 m hoog
- Twijgen met 1 stekel
- Bladeren rood (in de schaduw worden ze roodgroen), spatelvormig
- Vruchten rood, ellipsvormig
- Bloemen heldergeel, mei
- Staat het liefst dus op humusrijke zandgrond. Halfschaduw wordt vaak verdragen maar in de zon blijven de bladeren mooi van kleur.


Buddleja davidii 'Empire Blue'



Yuverta



- +/- 2 m hoog
- Bloemen in pluimen, diepblauw tot paarsblauw. Bloeit in augustus, september.
- Twijgen zachtbehaard, hoekig met wit merg
- Naakte viltige overstaande knoppen, vaak al wat uitgelopen in de winter
- Staat graag op een wat lichtere niet te natte grond. Is vorstgevoelig dus niet te vroeg snoeien. Staat het liefst in de zon.

Corylus avellana



- Heester tot 5 m hoog
- Mannelijke bloemen bloeien in januari, februari in lange katjes
- Bladeren zijn rond, toegespitst met een hartvormige bladvoet
- Twijgen zigzaggend, lichtbruin en dicht behaard
- Stelt weinig standplaatsseisen, verdraagt zelf zware schaduw

Forsythia intermedia



Yuverta


- 2 tot 3 m hoog
- Twijgen 4-kantig en met wratachtige lenticellen. Merg is zacht of ontbreekt. Bladmerk met 1 halve maanvormige spoor
- Bladeren ovaal tot langwerpig met gezaagde bladrand
- Bloemen in april, geel met twee tot drie bijeen
- Stelt niet veel eisen aan de standplaats maar staat wel graag in de zon.

Ligustrum vulgare



- 4-5 m hoge, dichtvertakte heester
- Bladeren smal ovaal, dofgroen, blijven lang aan de struik
- Bloeit in juni-juli in opstaande witte pluimen, vruchten zijn zwart
- Knoppen tegenoverstaand, iets verspringend. Knoppen bruin, aan de top donker
- Stelt weinig eisen aan de groeiplaats

Lonicera nitida



Yuverta


- Breed opgaand tot 1 tot 2 m hoog
- Bladeren wintergroen, eirond, ong. 1 cm lang. Tegenoverstaand
- Twijgen purper, behaard.
- Stelt niet veel eisen, kan in de (half)schaduw maar liefst in de zon.
- Kan als solitair maar wordt vooral als vakbeplanting, al dan niet geschoren. toegepast

Kerria japonica




- 2-3 m hoog, uitstoelend
- Twijgen groen, met wit merg. Knoppen verspreid met bruinige schubben. Bladmerk smal met drie sporen
- Bloei april – juni met goudgele gevulde bloemen (de enkele bloem wordt als een variëteit beschouwd)
- Bladeren eirond, toegespitst en dubbel gezaagd (brandnetelblad)
- Stelt niet veel eisen aan de standplaats. Echter, op voedselrijke grond kan hij gaan woekeren. Staat graag in de zon.

Magnolia soulangeana



- 3 tot 5 m hoog
- Bloei in april-mei met opstaande, klokvormige, wit met roze gekleurde bloemen. Bloeit voor de bladontluiking.
- Knoppen verspreid, met 1 knopschub en een ringvormig litteken per knop. Bloemknoppen viltig behaard
- Bladeren verspreid, omgekeerd eivormig
- Staat graag in de zon en houdt van een iets zure grond.




Prunus spinosa



Yuverta


- 4-6 m hoge heester
- Bloemen zeer vroeg (maart), wit, alleenstaand
- Twijgen wittig 'berijpt', kortloten vaak in een doorn eindigend
- Bladeren 2-4 cm, aanvankelijk behaard
- Dicht vertakt ('ondoordringbaar')
- Stelt geen bijzondere eisen aan de groeiplaats

Prunus triloba



- 1-2 m hoog, echter meestal als halfstam toegepast
- Knoppen vaak met drieën bij elkaar (twee bloemknoppen en één bladknop. Knoppen soms omgeven door lijnvormige steunblaadjes)
- Bladeren enigszins lobbig, dubbelgezaagd
- Bloemen eind maart, roze, half gevuld
- Staat graag in de zon, zeker ivm de sterke snoei (en teruggroei)

Ribes sanguineum



Yuverta

- 2-2,5 m hoog
- Twijgen roodbruin, knoppen spits, roodgroen
- Roze bloemen, april mei, in afhangende trossen
- Bladeren 3-5 lobbig, beide zijden behaard, onder wat meer dan boven
- Graag op een zonnige en voedselrijke standplaats

Rosa



Rosa glauca

- Bladeren en twijgen berijpt
- Twijgen met stekels



Rosa rugosa

- Deelblaadjes rond- ovaal
- Blaadjes mat met diepliggende nerven
- Twijgen met borstels en stekels



Rosa nitida

- Deelblaadjes langwerpig
- Blaadjes glanzend en vlak
- Twijgen met voornamelijk borstels


Yuverta

Rosa glauca > Glauca = blauw

Rosa nitida = Glansroos > bladeren glanzend


Rosa rugosa = Rimpelroos > bladeren 'gerimpeld'

Rosa glauca




- 2-3 m hoog, met overhangende twijgen
- Bloemen (juni) rozerood, met een lichter hart
- Twijgen aanvankelijk blauw berijpt, later rood, aan de top nauwelijks stekels.
- Bladeren samengesteld, blauw berijpt
- Kan in de schaduw maar (zoals alle rozen) staat hij het liefst in de zon. Op voedselrijke bodems.

Rosa nitida




- 0,5 tot 1 m hoog
- Bloemen roze-rood in juni - juli
- Twijgen bruin met voornamelijk borstelharen
- Bladeren met glanzende bovenzijde (nitida = glimmend)
- Graag op voedselrijke grond, vormt veel worteluitlopers

Rosa rugosa



- 1,5 tot 2 m hoog
- Twijgen grijs met stekels en borstelharen
- Bladeren met diepliggende nerven (rimpelig > rimpelroos)
- Bloemen roze-rood, van juni tot september! Er zijn ook witte cultivars
- Kan goed tegen droogte en tegen (wege)zout.
- Verspreid zich vlot via worteluitlopers en zaad. Verdringt daarbij inheemse soorten. Alhoewel er (nog) geen verbod is, wordt deze plant wel als een invasieve exoot gezien.

Salix babylonica 'Tortuosa'



Yuverta




- 10-15 m hoog, snelgroeiend
- Twijgen en takken gedraaid
- Bladeren lancetvormig, gekruld
- Staat graag op een voedselrijke, vochtige bodem

Sambucus nigra



- Tot 7 m hoge heester
- Bladeren tegenoverstaand, veervormig samengesteld
- Twijgen lichtbruin met wrattige lenticellen, zacht merg
- Bloemen roomwit in schermvormige tuilen
- Groeit bij voorkeur op een rijke bodem en verdraagt veel schaduw

Spiraea



Yuverta

- Spiraea > bladmerk met 1 spoor, knoppen spiraalsgewijs langs de twijg, kleiner dan 5 mm
- *S. vanhouttei* > ruitvormig blad, bloemen langs twijgen, bloeit in het voorjaar
- *S. japonica* > ovaal tot lancetvormig blad, bloemen eindstandig, bloeit in de zomer

Spiraea x vanhouttei



Yuverta



- 2 tot 3 m hoog, met sierlijk overhangende takken
- Bloei in mei-juni, in witte schermen langs de twijgen
- Bladeren eivormig tot ruitvormig
- Knoppen 1-3 mm groot, vaak met twee bij elkaar, afstaand
- Twijgen kaal, roodbruin van kleur, iets zigzaggend verlopend
- Stelt geen bijzondere eisen aan de standplaats

Spiraea japonica




- 0,3 tot 0,8 m hoog
- Twijgen kaal, soms lijsten vanaf de bladkussens aflopend
- Bladeren eirond-lancetvormig
- Roze bloemen in eindstandige tuilen in juni-augustus
- Stelt geen bijzondere eisen aan de standplaats

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'



- 3 tot 6 m hoog (heester of kleine boom)
- Bloei in mei, dubbele witte bloemen in pluimen
- Bladeren hartvormig, toegespitst
- Knoppen groen, met twee opvallende eindknoppen
- Staat graag in de zon

Viburnum opulus



Yuverta

- 1,5 tot 2,5 m hoge heester
- Blad 3 lobbig 6-12 cm kruisgewijs tegenoverstaand
- Bloemen in witte bloemschermen
- Twijg: lichtbruin met lenticellen. Kruisgewijs tegenoverstaande aanliggende roodbruine knoppen en zeskantig
- Standplaats: vochthoudende grond in de zon.