

IBS Plant

lijst 3 | wilde flora

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Ficaria	verna		lentebloeier	Speenkruid
2	Galinsoga	quadriradiata			Harig Knopkruid
3	Glechoma	hederacea		klimopbladig	Hondsdrif
4	Heracleum	sphondylium			Gewone Bereklauw
5	Matricaria	recutica			Echte Kamille
6	Petasitis	Hybridus			Groot Hoefblad
7	Plantago	lanceolata		smalbladig	Smalle Weegbree
8	Sedum	acre		scherp	Muurpeper
9	Symphitum	officinale		geneeskrachtig	Smeerwortel
10	Tussilago	farfara			Klein Hoefblad



Ficaria verna

Speenkruid

verna = voorjaarsbloeiend



- Stengels liggend op opstijgend 5 – 15 cm hoog
- Bladeren glanzend, afgerond hart- of niervormig, gekarteld, de bovenste iets handvormig-hoekig gelobd
- `bloemen alleenstaand, langgesteeld, geel met 8 – 12 bloemdekbladen, bloeitijd maart - mei

Galinsoga quadriradiata

Harig Knopkruid



- Plant is 20 – 70 cm hoog, stengel is dicht wit behaard
- Blad is eirond, spits, grof verspreid getand, tegenoverstaand
- Bloemhoofdjes 3 – 5 mm land en breed met meestal 5 korte, witte lintbloemen en gele buisbloemen
bloeitijd mei – okt.

Glechoma hederacea

Hondsdrif

hederacea = klimopbladig



- Stengel kruipend-opstijgend, hoogte 15 – 60 cm
- Bladeren kaal, gesteeld, niervormig of rondachtig met hartvormige voet, gekarteld
- Bloemen in armbloemige schijnkransen in de bladoksels, blauwpaars, bloeitijd april - sept

Heracleum sphondylium

Gewone Bereklauw



- Stengel 5 -20 mm dik, met stijve borstels bezet, kantig gegroefd, hoogte 30 – 150cm
- Bladeren drie- of viervoudig veerdelig, de onderste tot 50 cm lang.
- Bloemen in samengestelde schermen met 15 – 30 stralen vaak groenachtig of roze aangelopen, bloeitijd juni – okt.

Matricaria recutica

Echte Kamille



- Stengel rechtopstaand, vertakt, kaal. Plant met krachtige aromatische geur, hoogte 15 – 30 cm
- Bladeren dubbel veerdelig met fijne slibben
- Bloemhoofdjes in schermvormige pluimen, lintbloemen wit bij oudere bloemen omlaag gericht, buisbloemen daarbinnen geel

Petasitus Hybriden

Groot Hoefblad



- Plant spinnenweb-achtig behaard, in de bloeitijd zonder groene bladeren slechts met bladschubben
hoogte 30 – 60 cm
- De grondbladeren zijn zeer groot breed hartvormig, en doen wat aan rabarber denken
- Bloemhoofdjes in grove trossen bijeengeplaatst, vuilpurper tot bleekroze, soms geelwit welriekend

Plantago lanceolata

Smalle Weegbree

lanceolata = smalbladig



- Stengel gegroefd, 5 – kantig, hoogte 5 – 50 cm
- Bladeren in een wortelrozet, lancetvormig, gaafrandig, met 5 -7 parallelle nerven
- Bloem onopvallend, in een langwerpige-ronde aar, bloeitijd mei – okt.

Sedum acre

Muurpeper

acre = scherp



- Stengel kruipend-opstijgend, rijk vertakt, 5 – 15 cm hoog
- Blad dik, eivormig met afgeronde voet, zonder spoor, 4 mm lang en 3 mm breed stomp
- Bloemen, kroonbladeren 6 -7 mm lang fijn toegespitst, goudgeel, bloeitijd juni-aug.

Symphitum officinale

Smeerwortel

officinale = geneeskrachtig



- Stengel onderaan rijkvertakt, hoogte 30 – 100 cm
- Blad langs de stengel aflopend, de stengel daardoor breed gevleugeld,
- Bloemen roodpaars, roze of vuilwit, bloeiwijze knikkend, een gevorkte schicht. Bloeitijd mei - sept

Tussilago farfara

Klein Hoefblad

-



- Plant spinnewebachtig behaard, tijdens de bloei alleen met bladschubben aan de bloeistengel; de grondstandige bladen verschijnen pas tegen het eind van de bloeitijd. Hoogte 10 – 30 cm
- Blad is langgesteeld, rondachtig-hartvormig, getand, van onderen witviltig
- Bloemen in alleenstaande hoofdjes en geel, bloeitijd maart - april



einde presentatie

Yuverta