

IBS Plant

lijst 4 | heesters

Hovenier niveau 3 BOL-BBL
Opzichter-Uitvoerder niveau 4 BOL-BBL



Inhoud

1	Aralia	elata		hoog	Duivelswandelstok
2	Buddleja	davidii	'Nanho Blue'		Vlinderstruik
3	Ceanothus	delilianus	'Gloire de Versailles'		Amerikaanse Sering
4	Chaenomeles	japonica	cv.	uit Japan	Japane Sierkwee
5	Cornus	florida		uit Florida	Amerikaanse Kornoelje
6	Cornus	kousa			Japane Kornoelje
7	Cornus	mas		man	Gele Kornoelje
8	Cotinus	coggygia			Pruikenboom
9	Cotoneaster	horizontalis		horizontaal groeiend	een Dwergmispel
10	Crataegus	monogyna		eenstijlig	Eenstijlige Meidoorn
11	Deutzia	gracilis		sierlijk	een Bruidsbloem
12	Euonymus	fortunei	cv.		een Kardinaalsmuts
13	Hibiscus	syriacus		uit Syrie	Tuinhibiscus
14	Hypericum		'Hidcote'		Hertshooi
15	Ilex	crenata	cv.	getand blad	Japane Hulst
16	Lavandula	angustifolia	'Hidcote'	smalbladig	Lavendel
17	Physocarpus	opulifolius		blad van sneeuwbal	Blaasspirea
18	Potentilla	fruticosa	'Goldfinger'	heesterachtig	Ganzerik
19	Prunus	laurocerasus	'Otto Luyken'	blad als laurier	Laurierkers
20	Prunus	lusitanica			Portugese Laurierkers
21	Symphoricarpos	chenaultii			een Sneeuwbes
22	Viburnum	davidii			Dwergsneeuwbal
23	Viburnum	plicatum	'Mariesii'	gevouwen	Japane Sneeuwbal
24	Weigela		'Purpurea Groep'		Weigelia

Aralia elata

Duizelwandelstok

elata = hoog



- Een hoge, open struik, dikwijls wortelopslag vormend, kan tot 10 m hoog worden
- Bladeren zomergroen, dubbel, soms driedubbel geveerd, 40 – 80 cm lang
- Blaadjes 5 – 12 cm eirond, onderzijde grijsgroen, soms gestekeld

Aralia elata

Duizelwandelstok

elata = hoog



- Kleine, crème witte bloemen (augustus-sept) in grote, eindstandige, schermvormige pluimen, 35 cm
- Dikke gestekelde, weinig vertakte grijze twijgen, grote eindknop
- Zwarte bessen, en een rode herfstkleur

Buddleja davidii 'Nanho Bleu'

Vlinderstruik

davidii = naar David



- Een 3-4 m hoge, opgaande struik
- Bloemen (aug –sept) diepblauw tot paarsblauw
- Blad 15-25 cm lang, lancetvormig met een spitse top, fijn gezaagd, bovenzijde donkergroen

Buddleja davidii 'Nanho Bleu'

Vlinderstruik

davidii = naar David



- Iets geurende bloemen, in 15-30 cm eindstandige pluimen
- Twijgen zacht behaard, hoekig met groot wit merg, knoppen overstaand, viltig, vaak in de herfst of winter al uitgroeiend
- Wordt zeer veel door vlinders bezocht

Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'

Amerikaanse sering



- Opgaande 75 – 150 cm hoge struik
- Bladeren zijn zomergroen, 4 – 9 cm lang, zeer lang aanblijvend
- Eirond, kort toegespitst, bovenzijde groen, onderzijde grijsgroen of groen, bladrand scherp gezaagd

Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'

Amerikaanse sering



- Kleine bloemen bloeitijd juli – sept.
- Jonge twijgen roodbruin, dichtbehaard, knoppen verspreid
- Bloemen zijn azuurblauw, in grote eind- of zijstandige pluimen

Chaenomeles japonica cv.

Japanse sierkwee

japonica = uit Japan



- Een lage, breeduitgroeïende struik, circa 1 m hoog
- Bladeren zomergroen, 3 – 5 cm lang, ovaal eirond, kaal, rond fijn gezaagd, bovenzijde matglanzend groen
- Onderzijde lichtgroen, grote steunbladeren scheef eirond

Chaenomeles japonica cv.

Japanse sierkwee

japonica = uit Japan



- Bloemen (maart – april) oranje-rood, 2 – 3 cm Ø, 2 – 6 bijeen in bundels
- Aanvankelijk behaard, later kale, enigszins wrattige bruingele twijgen, met fijne tot 12 mm lange doorns
- Vruchten 3 – 4 cm Ø, vrijwel rond, geelgroen, zeer lang aanblijvend

Cornus florida

Amerikaanse Kornoelje

florida = uit Florida




- Meestal een struik, soms tot een boompje uitgroeiend, tot circa 5 m hoog
- Twijgen roodbruin, aan de top berijpt.
- Bladeren 7 – 15 cm lang, breed-ovaal of eirond, toegespitste knop, donkergroen bovenzijde, grijsgroen onderzijde.

Cornus florida

Amerikaanse Kornoelje

florida = uit Florida



- Knoppen vrijwel verscholen, duidelijk verschil tussen bloemknop en bladknop
- Bloemen (mei), groengeel, in circa 12 mm brede hoofdjes omgeven door 4 grote schutbladen, wit
- Vruchten rood, eivormig, 1 cm lang, in dichte bundels

Cornus kousa


Japanse Kornoelje



- Een 5 – 6 m hoge struik of kleine boom
- Bladeren eivormig, 5 – 9 cm lang, top kort toegespitst, 4 – 5 paar zijnerf, donkergroen, ruw aanvoelend
- Twijgen bruin, kaal, duidelijke eindknop, zijknoppen klein, net zichtbaar

Cornus kousa

Japanse Kornoelje



- Bloemen (mei – juni) donkerpurper, in zeer kleine, dichte hoofdjes, door 4 crème witte, langgepunte schutbladen omgroeit
- Opvallende framboosvormige vruchten, vlezig, rozerood, 1,5 – 2,5 cm Ø, langgesteeld
- Scharlaken-rode herfstkleur

Cornus mas

Gele Kornoelje

mas = man



- Een hoge struik of kleine boom, tot circa 5 m hoog, met een schermvormige kroon
- Bladeren eirond, 5 – 8 cm lang, aanliggend behaard, top toegespitst, bovenzijde glanzend donkergroen
- Twijgen groen, aan de top 4-kantig, aanvankelijk behaard, in het najaar zijn talrijke ronde bloemknoppen al zichtbaar, bladknoppen bruingroen, spits, afstaand, fijn behaard

Cornus mas

Gele Kornoelje


mas = man



- Bloemen (febr. – april) goudgeel, in viertallige, kleine schermen, omwindsel met kleine gele schutbladen
- Vruchten rood, langwerpig, 1.5 – 2 cm lang, eetbaar, wrang van smaak

Cotinus coggygria

Pruikenboom



- Een 2 – 3 m hoge en brede struik met opgaande twijgen
- Zomergroene, verspreide bladeren, 4 – 8 cm langt, omgekeerd eirond tot ovaal, stompe top, gave bladrand, bovenzijde donkergroen
- Jonge twijgen groen tot paarbruin, glad, knoppen verspreid, klein, met vele, bruin gekleurde schubben, eindknop groter

Cotinus coggygria

Pruikenboom



- Bloemen (mei – juni) klein, geelgroen, de bloemen zelf vallen spoedig af
- Grote eindstandige, 15 – 20 cm lange pluimen, de lange, violette stelen met afstaande haren blijven aan en verlengen zich (vandaar de naam pruikenboom)
- Herfstkleur geel

Cotoneaster horizontalis

Een Dwergmispel

horizontalis = horizontaal groeiend



- Een circa 50 cm hoge, breed uitgroeïende struik met horizontale vertakking
- Bladeren rond-ovaal, kort toegespitst, 5 – 12 mm lang, bovenzijde glanzend donkergroen
- Twijgen aanvankelijk geelbruin, aanliggend behaard, opvallend in een horizontaal vlak geplaatst (visgraat)

Cotoneaster horizontalis

Een Dwergmispel

horizontalis = horizontaal groeiend



- Bloemen roze, naar wit verkleurend, 1 – 2 bijeen, kroon opstaand
- Vruchten helderrood, vrijwel rond, 5 mm lang
- Opvallende oranjerode herfstkleur

Crataegus monogyna

Eenstijlige Meidoorn

monogyna = eenstijlig



- Algemeen voorkomende boom of struik tot 10 m hoog
- Bladeren eivormig, 3 – 7 cm lang, 5 – 7 lobbig tot veerdelig
- Twijgen aanvankelijk behaard, later kaal en grijsbruin met 2 – 2,5 cm lange doorns

Crataegus monogyna

Eenstijlige Meidoorn

monogyna = eenstijlig



- Bloemen (mei – juni) wit, tot 16 in een tuil geplaatst
- Vruchten dofrood, eirond met één steen
- Geel oranje herstkleur

Deutzia gracilis

Een Bruidsbloem

gracilis = sierlijk



- Een 50 – 100 cm hoge, rijkbloeiende, sierlijke struik
- Bladeren 3 – 7 cm lang, lancetvormig, gezaagd, lang toegespitst
- Twijgen dun, lichtbruin, later afschilferend, opgaand groeiend

Deutzia gracilis

Een Bruidsbloem

gracilis = sierlijk



- Bloemen (mei – juni), zuiver wit, 1.5 – 2 cm breed
- In 4 – 9 cm lange, behaarde pluimen
- Doosvrucht rond eivormig met afvallende kelk

Euonymus fortunei cv.

Een Kardinaalsmuts

-



- Een zeer variabele, bodembedekkende of klimmende plant (tot circa 5 m hoog)
- Bladeren wintergroen, in de jeugdfase eirond-ovaal, 2 – 3 cm lang, afgerond getand, bladeren in diverse tinten
- Groene twijgen, knoppen overstaand

Euonymus fortunei cv.

Een Kardinaalsmuts



- Bloemen (juni – juli) groenwit, onopvallend, 5 mm in diameter, in 7 – 15 bloemige schijntrossen
- Vruchten witachtig geel tot groengeel
- Diverse toepassingsmogelijkheden, zoals klimmende cv's, bodembedekking, vakbeplanting

Hibiscus syriacus

Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrië



- Een dichte, opgaande, 2 – 3 m hoge struik
- Bladeren zomergroen, eivormig, 5 – 9 cm, meestal drielobbig, soms meerlobbig of ongelobd, bovenzijde frisgroen en glad onderzijde grijsgroen, grove tanding
- Twijgen grijs, aanvankelijk viltig behaard, later kaal, knoppen verspreid

Hibiscus syriacus

Tuinhibiscus

syriacus = uit Syrië



- Bloemen (aug. – sept) diverse kleuren, breed trechtervormig (6 cm breed), alleenstaand, okselstandig
- Opvallend is de plaatsing van de meeldraden op de stijl
- Een droge, opspringende doosvrucht

Hypericum 'Hidcote'

Hertshooi

calycinum = met grote blijvende kelk



- Hoogte 30 tot 40 cm, breeduitgroeind
- Lancetvormige bladeren
- Gele bloemen met opvallend lange centrale meeldraden (juni-september)

Hypericum 'Hidcote'

Hertshooi

calycinum = met grote blijvende kelk



- Rode tot zwarte bessen na de bloei.
- Bladhoudend, half wintergroen

Ilex crenata cv.

Japanse Hulst

crenata = getand blad



- Een dicht vertakte, opgaande struik tot circa 200 cm hoog
- Bladeren wintergroen, ovaal – lancetvormig 1 – 3 cm lang, zwak gekarteld – gezaagd, donkergroen
- De 'Convexa' heeft bolstaande bladeren en glanzend groen, de 'Golden Gem' goudgele bladeren

Ilex crenata cv.

Japanse Hulst

crenata = getand blad



- Bloemen (mei – juni) wit, zeer klein, 4 – tallig aan lange stelen
- Vruchten kogelrond, klein en zwart
- Wordt o.a. toegepast als solitair, lage haag en in vakbeplanting

Lavandula angustifolia 'Hidcote'

Lavendel

angustifolia = smalbladig



- Halfheester, 40 – 60 cm hoog
- Bladeren wintergroen, overstaand, 3 – 5 cm lang, lijnvormig met een ingerolde bladrand, aanvankelijk aan beide zijde behaard, later kaal, grijs - groene bladkleur
- Twijgen rechtopstaand, grijsbehaard en vierhoekig

Lavandula angustifolia 'Hidcote'

Lavendel

angustifolia = smalbladig




- Bloemen (juni – aug) lavendelblauw, in eindstandig gedrongen bloeiwijze, 8 – 10 mm lang
- Bovenlip twee-, onderlip drielippig
- Bekend door de sterk geurende bladeren en bloemen, wordt ook gekweekt voor lavendelwater en poeder

Physocarpus opulifolius

blaasspirea

opulifolius = blad van sneeuwbal



- Een 2 – 3 m hoge en brede struik, opgaand met overhangende zijtakken en twijgen
- Bladeren zomergroen, eirond, 3 – 5 lobbig, 5 – 11 cm aan de kortloten meestal kleiner, rand dubbelgezaagd
- Twijgen groen – bruin, kaal met verspreide knoppen

Physocarpus opulifolius

blaasspirea

opulifolius = blad van sneeuwbal




- Bloemen (juni – juli) in circa 5 cm brede, halfronde, eindstandig aan kortloten geplaatste tuilen, crème-wit
- Oudere twijgen schilferen af.
- Bruinrode blaasvruchten

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Een 50-80 cm hoge, enigszins spreidend groeiende struik
- Bladeren zomergroen, verspreid aan bloeitwijgen, meestal 5-talig waarbij de 3 topblaadjes met de spil zijn vergroeid
- Twijgen roodbruin, aanvankelijk behaard, later kaal en afschilferend, knoppen achter bladresten verborgen

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Ganzerik

fruticosa = heesterachtig



- Bloemen hebben een diepgele, zeer grote bloemen, bloeit van juni-oktober
- Na de bloei krijgt ie doosvruchten
- Ze worden veel toegepast in groepen, hagen, randen, bodembedekker en als solitair

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

Laurierkers

laurocerasus = blad als laurier



- Een traag groeiende, brede en compacte, circa 1 m hoge cultivar
- Langwerpige- lancetvormige, 7 – 11 cm lange, toegespitst donkergroene bladeren
- Jonge twijgen groen en kaal, later donkerder, knoppen groen

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

Laurierkers

laurocerasus = blad als laurier



- Bloemen wit (mei – juni en aug. – sept) in 20 cm lange, opstaande trossen
- Vruchten circa 1 cm lang, zwartrood – zwart van kleur
- Zeer geschikt voor lage vakken, randen en hagen

Prunus lusitanica

Portugese Laurierkers


-



- Groenblijvende plant, kan 3 – 5 m hoog worden
- De twijgen hebben een dieproze kleur
- Dikke, leerachtige bladeren, ovaal – vormig met scherpe top en gezaagde bladrand

Prunus lusitanica

Portugese Laurierkers



- Witte rechtopstaande bloemtrossen die een aangename geur verspreiden, bloeitijd juni - juli
- De vrucht is een kleine kersachtige steenvrucht, aanvankelijk groen of roodachtig, die donkerpaars of zwart wordt als hij rijp is
- De plant trekt veel vlinders en bijen aan dit komt door zijn dichte en compacte groei

Symphoricarpus chenaultii


een Sneeuwbes



- Een opgaande, sierlijk vertakte struik, tot ongeveer 150 cm hoog opgroeiend
- Bladeren eirond, 1 – 2 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde blauwgroen, wit behaard
- Jonge twijgen roodachtig, later bruin, fijn behaard

Symphoricarpus chenaultii

een Sneeuwbes



- Bloemen (juli – sept) roze, in korte, eindstandige bloeiwijzen
- Besheester o.a. voor grovere beplanting en wordt in vakken toegepast
- Vruchten vrijwel rond, 4 – 8 mm dik, meestal rood met witte punten, ook wel wit-roze met rode punten

Viburnum davidii

Dwergsneeuwbal



- Een gedrongen tot ongeveer 50 cm hoge, breed uitgroeiende struik
- Bladeren wintergroen, ovaal tot omgekeerd eirond, 5 – 12 cm, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter, drienervig, gaafrandig
- Twijgen groen, kaal met wratten bezet

Viburnum davidii

Dwergsneeuwbal



- Bloemen (mei – juni) roze–wit in tot 8 cm brede, meestal 7 – stralige tuilen
- Vruchten eirond, staalblauw, tot 6 mm lang, opvallend lang aanblijvend

Viburnum plicatum 'Mariesii'

Japanse Sneeuwbal

plicatum = gevouwen



- Een 2 – 3 m opgaande, breed uitgroeiende struik met een etageachtige zijvertakking
- Bladeren zomergroen, variabel, breed eirond tot ovaal, 4 – 10 cm lang met iets verdiepte nerven, rand stomp getand, bovenzijde dof donkergroen, onderzijde grijsbruin behaard
- Twijgen grijsbruin, roestbruin, knoppen met roodbruine, in de winter afvallende schubben

Viburnum plicatum 'Mariesii'

Japanse Sneeuwbal

plicatum = gevouwen



- Bloemen (mei – juni) wit, vlakke bloeiwijze, met kleine fertiele bloemen en grote steriele randbloemen
- Vruchten eivormig, 8 mm lang, rood en rijpen in augustus
- Herfstkleur diep wijnrood

Weigela 'Purpurea Groep'

Weigela



- Een bloemheester tot circa 150 cm
- Bladeren zomergroen, ovaal toegespitst, 5 – 10 cm lang, blad kleur in bruin tot paars
- Twijgen bruingeel met duidelijke lenticellen, knoppen overstaand, spits, aanliggend

Weigela 'Purpurea Groep'

Weigela



- Bloemen zijn donkerroze (mei – juni)
- Binnenzijde is lichter van kleur, ongeveer 3 cm lange, klokvormige kroon
- Algemene toepassing, heestergroep in tuin en park



einde presentatie

Yuverta