

Kruiden 2020

Kenmerken

zaadonkruiden

Planten die zich uitsluitend via zaad verspreiden.

Voorbeeld: Herderstasje.

Kenmerk: Zaadonkruiden zijn onkruiden, die veel zaad produceren. Het zijn vaak eenjarige planten die zich snel verspreiden.

De zaden ontkiemen onder de juiste omstandigheden. (licht, temperatuur, vocht, grondsoort en eigenschappen, voedingstoestand bodem enzovoort.

Zaden, zeker als ze olie bevatten, kunnen jaren wachten tot de omstandigheden gunstig zijn. Sommige zaden kunnen na 50 jaar nog ontkiemen!



wortelonkruiden

Wortelonkruiden zijn onkruiden, die ondergrondse, meestal horizontaal lopende wortelstokken vormen. Bij afbreken kan elk stukje wortelstok met een knoop weer gaan wortelen en uitlopen. Tot deze groep behoort o.a. kweek.

Dit onkruid is lastig te bestrijden. Je moet de planten met wortel en al verwijderen.



Penwortel

Voorbeeld Paardenbloem.

De plant heeft geen haarwortels, maar net als een wortel een verdikte hoofdwortel. In deze penwortel zit reservevoedsel. Bij het verwijderen van de bovengrondse delen kan de plant daarom weer opnieuw uitlopen.

Planten met een penwortel groeien vaak op verdichte grond. Ze breken de grond met hun sterkere wortel open....



tredplant

Voorbeeld: varkensgras. Een plant die tegen betreden kan. Veel van deze onkruiden groeien op plekken waar op gelopen worden. Ze groeien dus ook op plekken waar gelopen wordt zoals wegbermen, grasvelden en verhardingen.

Ook tredplanten kunnen op sterk verdichte grond groeien.



Bovengrondse uitlopers (stengels)

Voorbeeld boterbloem.

Plant maakt stengels die over de grond
groeien. Waar ze de grond raken, maken ze
nieuwe wortels op die plek.



1. Heermoes of paardestaart

Wortelonkruid. Wortels kunnen wel metersdiep gaan.

Plant verspreidt zich via sporen (net als varens) in april en mei.

Heermoes is voor bepaalde planten giftig. Grassen kunnen niet kiemen in de buurt van heermoes.



2.(Ridder)zuring

Penwortel, overblijvend.

Bloeit vanaf augustus tot diep in de herfst.

De planten bevatten oxaalzuur. Licht giftig voor koeien en paarden.



3. Haagwinde, pispot

Wortelstok die snel afbreekt.

Bloei juni tot september.

Net voor het regent gaat de bloem sluiten.
Bloem open is mooi weer!



4.Paardenbloem

Penwortel en tredplant.

Bloeimaanden: April en mei, maar soms ook in augustus, september en oktober.

Plant is geneeskrachtig en eetbaar. (molsla)



5. Kleine veldkers

Zaadonkruid. Zaden kunnen jaren later nog ontkiemen.

Bloeimaanden: Februari, maart, april, mei, juni en juli.

Kleine veldkers is een vergeten wintergroente die veel vitaminen bevat. Het blad heeft een peperige smaak en kan worden gebruikt in salades, in stampot en als broodbeleg.



6.(vogel)Muur

Zaadonkruid.

Bloeit hele jaar door. Kan niet tegen vorst.

Eetbaar!: Vogelmuur is in trek bij vogels.
Volièrehouders gebruiken deze plant wel om hun vogels van groenvoer te voorzien.



7. Zevenblad

Wortelonkruid. Elk afgebroken stukje wortelstok kan weer uittgroeien tot een nieuwe plant.

Bloeimaanden: Juni en juli.

Zevenblad is eetbaar. (Romeinen namen deze groente mee naar Nederland) De bladeren kunnen bereid worden als spinazie. Gedroogd smaakt het naar peterselie.



8. Straat(jes)gras

Zaadonkruid.

Bloeit hele jaar door. Kan niet tegen vorst.

In gazons vaak te zien als het gras te kort wordt gemaaid!



9. Kweek

Wortelstokken. Elk afgebroken stukje wortelstok kan weer uittgroeien tot een nieuwe plant.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.



10. Grote brandnetel

Wortelstokken.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Grote en kleine brandnetel zijn belangrijk als waardplant voor de rupsen van sommige dagvlindersoorten. Plant is eetbaar.



11 Japanse duizendknoop

Wortelstokken met uitlopers. De soort kan
zeer sterk woekeren.

Bloeimaanden: Augustus en september.

Het was een plant voor de Japanse tuin.
Plant woekert echter sterk.



12.(alsem)Ambrosia

Zaadonkruid.

Het stuifmeel (pollen) veroorzaakt bij veel gevoelige mensen hooikoorts. Ook kan de plant bij aanraking een allergische reactie op de huid veroorzaken.

Bloeimaanden: Augustus, september en oktober.



13. Jacobskruiskruid

Penwortel.

De plant is giftig voor vee.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus,
september en oktober.



14. Knopkruid

Zaadonkruid.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus,
september en oktober.



15. Akkermelkdistel

Wortelstok.

Kenmerk; wit melksap bij breken van de stengel.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.



16. Akkerdistel

Wortelstok. De wortels kruipen ver en zijn sterk vertakt. Er zijn zowel horizontale (op ongeveer 20 cm diepte) als verticale wortels. Deze laatste wortels gaan soms tot twee meter diep

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

De akkerdistel wordt vanwege de aanwezige nectar door bijen en hommels bezocht. Hiernaast bieden lastig toegankelijke distelbegroeiingen broedplaatsen aan verschillende vogelsoorten.



17. Herderstasje

Zaadonkruid

Bloeit het hele jaar. Kan niet tegen vorst.

Vruchtje lijkt op een tas die herders vroeger bij zich hadden.



18.(Smalle) weegbree

Tredplant.

Blad kneuzen en op de huid leggen helpt tegen prikken van brandnetels.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september



19.Varkensgras

Tredplant

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november.

De plant werd aan het vee (varkens o.a) gegeven als geneesmiddel tegen kwalen.



20. Witte klaver

De kale stengels kruipen over de grond en wortelen op de knopen.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Drachtplant voor honingbijen en groenbemester in de akkerbouw.



21. Melganzenvoet, melde

Zaadonkruid.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Plant groeit alleen hard bij warm weer!

Eetbaar!



22. Kruipende boterbloem

Met kruipende, bovengrondse, bebladerde
uitlopers. (stengels)

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Licht giftig!



23. Kleefkruid

Zaadonkruid.

Plant heeft weerhaakjes op de stengels. Dit is nageemaakt in de fabriek en was basis voor de klittenband

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.



24. Hondsdraf

Bovengrondse stengeluitlopers

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Van verse hondsdraf kan 'thee' worden getrokken met een aangenaam kruidige smaak die ligt tussen die van groentenat en munt. De plant werd als geneeskrachtig kruid toegepast bij luchtwegklachten, jeuk en verwonding



25. Paarse dovenetel

Zaadonkruid

Bloeimaanden: Maart, april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Prikt niet.

Soms als tuinplant verkocht.



26. Reigersbek

tredplant met kleine penwortel

Bloeimaanden: April, mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Uitgebloeide bloem lijkt op reiger.



27. Ooievaarsbek

Zaadonkruid, tredplant

Bloeimaanden: April, mei, juni, juli, augustus en september.

Familie van de Geranium endressi, een tuinplant met iets grotere en mooiere bloemen.



28. Pitrus

Een korte, gedrongen wortelstok

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus

Je kunt biezematten vlechten van de sprietten.



29. Perzikkruid

Zaadonkruid

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Familie van de *Persicaria amplexicaulis*, een mooie tuinplant.



30.Canadese fijnstraal

Zaadonkruid met een vrij dunne, maar stevige penwortel

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Geneeskrachtig en eetbaar

