

Geboortehulp

Normaal gesproken verloopt de geboorte van de biggen op de natuurlijke wijze, zonder dat hulp nodig is. Soms is geboortehulp echter noodzakelijk en dan is een goede uitvoering van deze geboortehulp belangrijk.

Op deze kaart vindt u wanneer en hoe u geboortehulp het beste kunt uitvoeren.

Vorbereiding op de geboorte

- 1** Zorg dat de vloer onder de zeug schoon is. Verwijder regelmatig de mest achter de zeug. Biggen worden steriel geboren en hebben nog weinig weerstand. Nog beter is het om de roosters schoon te spuiten en te desinfecteren. Gebruik eventueel een werpmatje.
- 2** Zorg voor een zo goed mogelijke voorbereiding op de geboorte. Hang tijdig de warmtelampen boven het biggennest.
- 3** Schakel de vloerverwarming op tijd in. De biggen drogen dan sneller op en koelen minder af. Hierdoor gaan de biggen eerder naar de uier en nemen sneller biest op.

Geboortehulp

- 1** Het is gebruikelijk dat er tussen de geboorte van twee biggen een kwartier tijd zit. Duurt het langer dan 20 tot 30 minuten tot de volgende big wordt geboren, of de laatst geboren big is geheel droog, dan kan geboortehulp nodig zijn.
- 2** Een stapsgewijs werkplan voor de geboortehulp vindt u hieronder in het 'Werkplan geboortehulp'.



Geboortehulp

Werkplan geboortehulp

1

Reinig de schede met warm water en een antibacteriële zeep indien geboortehulp nodig is.

2

Werk bij de geboortehulp zeer hygiënisch. Rol de mouw van de overall op tot de oksel. Gebruik lange wegwerp-handschoenen en rijkelijk glijmiddel.



3

Breng met de handschoen ook glijmiddel aan op de buitenzijde van de schede en in het voorste deel van het geboortekanaal. Zo voorkomt u irritaties bij de zeug door het binnenbrengen van de arm. Bedenk goed dat gelten nog een nauw geboortekanaal hebben.

4

Gebruik middelen die de weeën opwekken, zoals oxytocine, alleen indien de zeug al langere tijd niet heeft geperst en indien de laatste big al langer dan een kwartier geleden is geboren. Controleer altijd of er geen big dwars in het geboortekanaal ligt voordat u oxytocine geeft (maximaal 10 i.E. per injectie). Gebruik geen oxytocine als de zeug nog perst. Anders loopt u kans op meer doodgeboren biggen.

