

Nieuwe aanbevolen rassen voor Engels raaigras

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft besloten om 3 nieuwe rassen van Engels raaigras, voedertype, op te nemen op de Aanbevelende Rassenlijst 2014.

De rassen, die hieronder worden genoemd, zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Engels raaigras – laat doorschietend (weidetype) – diploïde rassen

Rossera kweker: Euro Grass Breeding GmbH & Co KG, Lippstadt, Duitsland
vertegenwoordiger: Euro Grass B.V., Gennepe

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – diploïde rassen

Kaiman kweker: Euro Grass Breeding GmbH & Co KG, Lippstadt, Duitsland
vertegenwoordiger: Euro Grass B.V., Gennepe

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – tetraploïde rassen

Barcampo kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in zes gewaswerkgroepen. Met het bijbehorende onderzoek is, voor alle landbouwgewassen samen, in totaal circa 1,3 miljoen euro per jaar gemoeid.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 368 7523 of 06 – 52 06 43 26.

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal en onder vermelding van “CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2014” worden overgenomen.

Tabel 1. Engels raaigras - middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap



Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van beweidingproefvelden	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproefvelden	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweiding- en maaiproefvelden
Diploïde rassen								
Abosan 1	30-5	8,2	7,0	8,6	97	102	102	102
Arsenal	23-5	8,2	7,1	8,1	103	101	103	102
Toronto	24-5	8,1	6,8	7,6	104	101	99	100
Option	26-5	8,1	7,0	8,5	97	98	98	98
Chicago	23-5	8,6	6,9	7,9	96	98	100	99
Domiat 1	29-5	7,9	6,5	8,5	96	98	99	98
Rodrigo	25-5	8,2	6,7	7,2	102	102	100	102
Calvano 1	24-5	8,0	6,7	7,0	103	102	101	102
Gasata 1	1-6	8,1	6,9	8,2	91	96	100	97
Maestro	1-6	8,2	6,7	8,4	88	97	96	97
Nieuwe rassen 2012 - 2013								
Massimo	26-5	8,0	6,6	8,2	95	103	100	102
Trenio	23-5	8,3	6,7	8,5	99	100	101	100
Nieuw ras 2014								
Kaiman	31-5	7,9	6,9	8,4	95	103	102	103
Tetraploïde rassen								
Maurizio	24-5	8,2	7,7	8,9	106	100	102	100
Trivos	25-5	7,9	7,1	9,0	102	99	102	100
Besser	25-5	7,9	7,5	8,5	103	100	99	100
Hurricane	31-5	8,0	7,2	9,0	99	99	97	99
Aventino	23-5	7,9	7,5	8,2	105	99	99	99
Channi 1	30-5	7,5	7,4	9,2	98	99	97	99
Pomposo	26-5	7,9	7,5	8,6	99	99	99	99
Novello	2-6	8,1	7,3	8,7	92	99	100	99
Charlene	25-5	7,9	7,2	9,0	97	96	102	97
Ovambo 1	27-5	7,9	7,4	8,8	101	97	97	97
Catabi 1	27-5	7,4	7,1	8,5	104	97	98	98
Roy	25-5	8,1	7,3	7,9	102	97	100	98
Barelan	1-6	8,1	7,7	8,9	92	97	97	97
Cantalou	25-5	7,8	7,5	8,6	99	97	97	97
Turmalin	30-5	8,1	7,4	8,5	93	96	96	96
Nieuwe rassen 2012 - 2013								
Diwan	28-5	7,8	7,6	8,9	107	104	102	103
Binario	23-5	8,1	7,7	9,2	104	100	101	100
Melverde	24-5	8,1	7,0	9,4	96	99	101	100
Barfamos	29-5	8,2	7,8	9,0	96	101	102	102
Activa	22-5	7,8	7,5	9,1	103	101	97	100
Nieuw ras 2014								
Barcampo	29-5	8,0	7,8	9,3	99	100	101	100

Tabel 2. Engels raaigras - laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van beweideproefvelden	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproefvelden	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweide- en maaiproefvelden
Diploïde rassen								
Humbi 1	5-6	7,9	7,4	8,4	98	102	99	101
Bovini	6-6	8,1	7,1	8,1	98	101	102	101
Romark	3-6	8,0	7,1	7,6	98	102	99	101
Zenital	4-6	8,2	7,1	8,3	94	100	98	99
Candore	4-6	8,3	7,2	8,4	94	98	99	99
Jalinas	3-6	8,0	6,9	7,5	101	99	99	99
Tomaso	3-6	8,2	7,2	7,4	99	100	99	99
Burlina 1	3-6	7,9	6,9	7,5	97	100	101	100
Asturion	4-6	8,0	6,9	7,8	100	99	99	99
Astorga	4-6	8,2	6,8	8,6	90	98	97	98
Bakuri 1	6-6	8,1	7,4	8,3	96	98	98	98
Candia	3-6	8,3	7,0	7,7	97	99	96	98
Nieuwe rassen 2012 - 2013								
Barimero	6-6	8,4	7,3	8,1	102	104	104	104
Melluck	4-6	8,5	6,9	8,0	99	101	100	101
Bartombo	11-6	8,3	7,2	7,7	98	101	103	101
Nieuw ras 2014								
Rossera	5-6	7,9	6,9	8,3	98	104	103	104
Tetraploïde rassen								
Meltador	6-6	8,1	7,5	8,4	104	101	100	101
Rivaldo	3-6	8,0	7,6	8,9	101	100	100	100
Meracoli	4-6	7,9	7,4	8,5	104	102	99	101
Alcander	4-6	8,0	7,5	9,1	102	98	101	99
Barpasto	3-6	8,1	7,9	8,4	104	99	100	100
Polim	3-6	7,7	7,5	8,5	107	99	100	99
Como	7-6	7,5	7,2	8,2	99	100	102	101
Bocage	5-6	8,1	7,6	9,2	99	96	96	96
Barmaxima	4-6	8,0	7,6	7,0	102	99	100	100
Herbal	5-6	7,8	7,3	8,0	98	97	97	97
Nieuwe rassen 2012 - 2013								
Dromara	3-6	8,0	7,6	9,4	106	102	104	102
Estrada	8-6	8,1	7,4	8,9	101	102	101	102