

# Pijnscorekaart



	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3
UIER	<b>Subklinisch – mild</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoogde geleidbaarheid – celgetal</li> <li>• Vlokjes in de melk?</li> <li>• Gevoelig en/of afwijkend kwartier</li> <li>• Koe is minder actief</li> <li>• Koorts?</li> </ul>	<b>Mastitis met hard kwartier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergroot en pijnlijk kwartier</li> <li>• Koe is veel minder actief</li> <li>• Minder pensvulling/voeropname</li> <li>• Oren hangen af</li> <li>• Koorts (&gt; 39.0 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ernstig zieke koe met mastitis</b></li> <li>• Hard, pijnlijk afwijkend kwartier</li> <li>• Diepliggende ogen</li> <li>• Tandenkarsen en/of kreunen</li> <li>• Koude (afhangende) oren, koude poten (extremiteiten)</li> <li>• Koorts (&gt; 39.5 °C)</li> </ul>
KLAUWEN	<b>Afwijkende gang – licht kreupel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koe zet poot scheef weg</li> <li>• Trippelen, poot steeds optillen</li> <li>• Minder pensvulling/voeropname</li> <li>• Koe is minder actief</li> <li>• Koorts?</li> </ul>	<b>Kreupel koe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poot ontlasten bij staan en lopen</li> <li>• Ongelijke stappen en bewegen</li> <li>• Kromme rug</li> <li>• Moeilijk liggen en staan</li> <li>• Slechte pensvulling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ernstig kreupel koe</b></li> <li>• Koe staat op 3 poten</li> <li>• Opgezet warm gewricht</li> <li>• Slechte pensvulling/sterk vermagerd</li> <li>• Tandenkarsen en/of kreunen</li> <li>• Koorts (&gt; 39.0 °C)</li> </ul>
ALGEMEEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zichtbare beschadigingen op de huid</li> <li>• Minder makkelijk liggen, staan en bewegen</li> <li>• Koe is minder actief</li> <li>• Minder pensvulling/voeropname</li> <li>• Afwijkende mest</li> <li>• Oren hangen af</li> <li>• Haren overeind</li> <li>• Vieze neus/neusuitvloei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schouderbladen uit elkaar</li> <li>• Dubbele flankslag/pompen</li> <li>• Dof haarkleed</li> <li>• Kromme rug, opgetrokken buik, kop laag</li> <li>• Oren hangen af en zijn koud</li> <li>• Diepliggende ogen</li> <li>• Tandenkarsen en/of kreunen</li> <li>• Slechte pensvulling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte pensvulling/sterk vermagerd</li> <li>• Diepliggende ogen/in zichzelf gekeerde blik</li> <li>• Tandenkarsen en/of kreunen</li> <li>• Onwil te gaan staan, duikhouding, bek open</li> <li>• Koude (afhangende) oren, koude poten (extremiteiten)</li> </ul>



AKTIE *		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur opnemen</li> <li>• Specifieke actie: melkmonster nemen, poot controleren/klauw bekappen, magneet ingeven</li> <li>• Eventueel pijnstilling/ontstekingsremming geven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur opnemen</li> <li>• Specifieke actie: melkmonster nemen, poot controleren/klauw bekappen, magneet ingeven</li> <li>• Zeker pijnstilling/ontstekingsremming geven</li> <li>• Eventueel naar ziekenstal voor speciale aandacht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naar ziekenstal voor speciale aandacht</li> <li>• Intensieve behandeling met vloeistoftherapie (infusen, drenchen door dierenarts)</li> <li>• Eventueel overweging euthanasie</li> </ul>

\* Indien behandeling met antibiotica of andere diergeneesmiddelen nodig is, volg dan de instructies op uw bedrijfsbehandelplan (BBP) en overleg met uw dierenarts

# Pijnpreventietabel



	VOORKOMEN	VERZORGEN	VERPLEGEN
UIER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hygiëne (melkstal, boxen, roosters, afkalfstal)</li> <li>Droogstandsmanagement</li> <li>Melkinstallatie</li> <li>Vast protocol tijdens melken</li> <li>Dippen-Sprayen</li> <li>Controleren melkcontrole-uitslagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pijnstillers, antibiotica</li> <li>Oxytocine en uittrekken</li> <li>Uiermint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strohok/aparte huisvesting</li> <li>Infusen, drenchen</li> <li>Als laatste melken</li> <li>Makkelijk toegang tot vers voer &amp; water</li> </ul>
KLAUWEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruime huisvesting/vloer/koepad</li> <li>Hygiëne van roosters</li> <li>Preventief bekappen (2 à 3 keer per jaar)</li> <li>Voeding (structuur)</li> <li>Voer vaak aanschuiven</li> <li>Voorkomen onrust in stal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekappen</li> <li>Pijnstillers, antibiotica</li> <li>Klosje</li> <li>Verbinden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparte huisvesting/zandhok</li> <li>Regelmatig herbekappen</li> <li>Amputatie aangetaste klauw</li> <li>Tyloom verwijderen</li> <li>Makkelijk toegang tot vers voer &amp; water</li> </ul>
OVERIGE AANDOENINGEN (Stofwisseling, infectieziekten, e.d.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voeding</li> <li>Huisvesting/klimaat</li> <li>Ziektepreventie:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>hygiëne</li> <li>vaccinatie</li> <li>diergezondheidsprogramma's</li> </ul> </li> <li>Transitiemanagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snel ingrijpen bij mogelijke problemen (slepde melkziekte/lebmaag)</li> <li>Pijnstillers toedienen</li> <li>Weefselschade verminderen bij bijvoorbeeld onthoornen of verlossen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zand-/strohok</li> <li>Langdurige pijnstilling</li> <li>Makkelijk toegang tot vers voer &amp; water</li> </ul>