

Deel F: Pluimvee (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Algemeen | | |
| F.01 Er is contact tussen het aanwezige pluimvee en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| F.02 Ziek pluimvee wordt afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| F.03 Ziek pluimvee staat onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| F.04 Pluimvee met abscessen of verwondingen wordt direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| F.05 Aangekocht pluimvee wordt eerst in quarantaine geplaatst. Indien er nooit pluimvee wordt aangekocht: JA invullen | | |
| Aviaire influenza (AI) | | |
| F.06 Er wordt door middel van bloedonderzoek gecontroleerd op aanwezigheid van aviaire influenza bij gevoelige dieren. | | |
| F.07 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden er tracheaswabs opgestuurd om te controleren of het virus wordt uitgescheiden. | | |
| F.08 Dieren die influenza virus uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden. | | |
| Papagaaienziekte (psittacose) bij kromsnavels*/duiven | | |
| F.09 Aangekochte kromsnavels/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloaca swabs testen) Indien geen aankoop van kromsnavels/duiven: JA invullen | | |
| F.10 Kromsnavels/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld. Indien geen kromsnavels/duiven aanwezig: JA invullen | | |
| Papagaaienziekte (psittacose) bij kippen/kalkoenen | | |
| F.11 Aangekochte kippen/kalkoenen worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloaca swabs testen) Indien geen aankoop van kippen/kalkoenen: JA invullen | | |
| F.12 Kippen/kalkoenen met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld. Indien geen kippen/kalkoenen aanwezig: JA invullen | | |
| Salmonellose | | |
| F.13 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders krijgen bijproducten (bijvoorbeeld keukenafval) gevoerd. Indien geen eierverkoop of consumptie: NEE invullen | | |
| F.14 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders worden elke twee maanden op salmonellose gecontroleerd met behulp van mestonderzoek. Indien geen eierverkoop of consumptie: JA invullen | | |
| F.15 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders zijn vrij van <i>Salmonella enteritidis</i> , <i>Salmonella</i> Typhimurium en <i>Salmonella</i> Heidelberg. Indien geen eierverkoop: JA invullen | | |
| F.16 Op de eieren die worden verkocht wordt de raadatum vermeld. Indien geen eierverkoop: JA invullen | | |
| F.17 De dieren waarvan vlees wordt verkocht krijgen bijproducten (bijvoorbeeld keukenafval) gevoerd. Indien geen vleesverkoop: NEE invullen | | |
| F.18 De dieren waarvan vlees wordt verkocht worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd. Indien geen vleesverkoop: JA invullen | | |
| F.19 Aangekochte broedeieren zijn afkomstig van salmonellose negatieve koppels. Indien geen aankoop van broedeieren: JA invullen | | |
| Aviaire tuberculose | | |
| F.20 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose. | | |
| F.21 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen. | | |
| Bloedluis | | |
| F.22 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hiertegen behandeld. | | |
| F.23 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden. | | |

* met kromsnavels worden parkieten en papagaaien bedoeld.