



**Racumin<sup>®</sup>**  
FOAM 

## RODENTICIDE

- ✓ Op locaties waar voldoende alternatieve voedselbronnen zijn
- ✓ Op moeilijk te bereiken plaatsen



Huismuizen



Inhoud  
**500 ml e**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### WAARSCHUWING



#### GEVARENAANDUIDINGEN

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VOORZORGSMATREGELEN

- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
P280 Oog-/gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten – contactlenzen verwijderen, indien mogelijk – blijven spoelen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Naam van het middel: Racumin Foam  
Toelatingsnummer: 14585 N  
Type formulering: AE (aerosol dispenser-schuim)  
Werkzame stof (+ gehalte): Coumatetralyl (0,4%)



Toelatingshouder:  
Bayer CropScience SA-NV  
Energieweg 1  
3641 RT Mijdrecht  
Tel.nr: 0297-280666

Bayer Environmental Science SAS  
16 Rue Jean-Marie Leclair  
F-69009 LYON



NL84098965A - ARTICLE 84120758

Chargennummer: zie verpakking  
Productie datum: zie verpakking  
Houdbaarheid: tot 2 jaar na productie

**Bayer**



# Racumin<sup>®</sup>

## FOAM

### TOEGELATEN GEBRUIK

#### Product type

PT 14 Rodenticide.

#### Exacte beschrijving van het toegelaten gebruik

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van huismuizen in afgesloten ruimten.

#### Doelorganismen (inclusief ontwikkelingsstadia)

huismuizen.

#### Toepassing

In afgesloten ruimten.

#### Toepassingsmethode

Het middel moet als schuim moet worden gespreoid in gaten of doorgangen die door muizen doorlopen worden.

#### Dosering en frequentie van toepassing

Per behandelingspunt 4 – 30 g schuim voor muizen versproeien. Na 2 weken, de plaatsen waar schuim aangebracht werd controleren en eventueel vernieuwen.

#### Gebruikers

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

#### Verpakking grootte en materiaal

500 mL spuitbus, verpakt per 2 spuitbussen.

### GEBRUIKSVOORSCHRIFT

#### Gebruiksaanwijzing

##### Toepassingen:

Racumin Foam is een schuim tegen huismuizen. Het schuim op richels en in gaten of doorgangen sproeien die tekens van een regelmatig gebruik door muizen laten zien. De gaten of doorgangen slechts gedeeltelijk dichtsproeien, zodat de muizen het verdere verloop van de doorgang nog kunnen zien. De muizen zullen door de opening lopen en schuim in het vel meenemen. Dit schuim wordt dan opgenomen zodra de muizen hun vel schoonmaken. Na 2 weken de plaatsen waar schuim aangebracht werd controleren en eventueel vernieuwen. Schuimresten kunnen met een droge doek verwijderd worden.

Het schuim niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen.

Plaats het lokaas buiten het bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen.

Draag geschikte handschoenen bij het versproeien en verwijderen van het schuim. Na afloop handen wassen.

#### Vervolg bestrijdingsactie:

Maatregelen (laten) treffen in het belang van muizenwering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.)

Indien in aangebouwde ruimten ook muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest

management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt worden.

#### Resistentie management:

Voor de werkzame stof aanwezig in dit middel, coumatetralyl, is er een risico dat muizen resistentie ontwikkelen. Gebruik die middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met coumatetralyl bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

#### Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen.

- Draag geschikte handschoenen bij het versproeien en verwijderen van de schuim. Na afloop handen wassen. Bij het sproeien moet tevens een veiligheidsbril worden gedragen.
- Minstens 2 meter afstand houden tussen de plek waar schuim aangebracht wordt en waar eet- en drinkwaren en diervoeder aanwezig zijn en/of worden bereid.

Eerste hulpmaatregelen: Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.

In geval van nood contact opnemen met een dokter. Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

#### Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

De resten van het schuim verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, zodat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

1. Voor de beste resultaten gebruikt u Racumin® Foam bij kamertemperatuur.
2. Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt.
3. Bevestig de spuitspriet.
4. Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een veilige plaats.
5. Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken kunnen ontstaan ; doe zo nodig eerst een vlektest en veeg overmatig schuim weg met een droog papieren handdoekje.
6. Druk op de knop om het schuim op te spuiten.
7. Breng het schuim aan in bekende looppaden, doorgangen, holingangen en gaten in muren.
8. Zorg dat de knaagdieren de holingang nog kunnen gebruiken door deze duidelijk zichtbaar te houden en niet volledig met het schuim af te sluiten.
9. Creëer op looppaden met het schuim een obstakel waar het knaagdier overheen moet springen, dat zorgt ervoor dat er wat schuim aan de onderkant van zijn lijf blijft zitten. Het obstakel moet niet te hoog zijn, het knaagdier moet er overheen kunnen kijken; anders zal het zich omdraaien en een andere route nemen.
10. Houd minimaal een afstand van 2 meter aan van opslagplaatsen voor voedsel, diervoeder en oppervlakken waar voedsel wordt bereid.
11. Breng alleen aan op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor vee, kinderen en diersoorten die geen doelwit vormen.
12. Als u het product boven uw hoofd aanbrengt, zorg er dan voor dat u de spuitbus rechtop houdt.
13. Doe de veiligheidsdop er terug op als u klaar bent met het aanbrengen van Racumin® Foam.
14. Het aangebrachte schuim blijft meestal 7-12 dagen stabiel, afhankelijk van aanraking en temperatuur/vochtigheid.
15. Racumin® Foam wordt door de muis opgegeten als deze zichzelf verzorgt.
16. Gebruik samen met een traditioneel lokaas voor de beste resultaten.