

7. Zaaïen

Voedergewassen




- Alleen NAK gecertificeerd zaad mag.
- Wel kiemkracht > 90%
- Géén koudetest → pas op met buitenlands
zaad
- Behandeld zaad:
 - schimmels
 - ritnaalden
 - fritvlieg
 - vogels

Problemen voor biologisch

Zaaien

- Na 20 april tot 1 mei (gewassen veranderen)
 - Bodemtemperatuur > 10°C
 - Week goed weer i.v.m. kieming
 - 4 - 5 cm diep
 - Rijenbem. 5 cm naast en 4 cm eronder
 - 100.000 planten per Ha (blad)
 - Voor 1 mei + 10 - 15%
 - Na 1 mei + 0 - 5 %
-
- Afstand zaaien ook afhankelijk van tijdstip en aantal planten/ha (10-16cm)

Bewerkingsdiepte,
zaai­bed­be­rei­ding




Opkomst valt tegen

- Bijzaaien < 45.000 planten
- Overzaaien < 20.000 planten

- Met vroegste ras
- 10 cm naast de rij


- Gangbaar is rijen op 75 cm

75 cm




75 cm

Stereozaai




10 cm 65 cm

Deltazaai



17,5 cm 57,5 cm

Ruitzaai



34 cm

Zaaien met ondervrucht

- Oplossing voor:
 - Bescherming erosie
 - Verhoogt draagvermogen
 - Verwerkt overtollig stikstof
- Mag ontwikkeling mais niet hinderen
- Uitzaaien bij 3-6 bladstadium
- Breedwerpig(kunstmeststrooier)

- Lees hoofdstuk 7 handboek
- Maak vragen hoofdstuk 7 werkboek (behalve vraag 103)