



NMT

Nederlandse Maatschappij
tot bevordering
der Tandheelkunde



Telefoonkaart

Vragen

- Leeftijd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Gaat het om een melktand of een blijvende tand?
- Staat de tand los of is er een stuk van de tand afgebroken?
- Is de tand verplaatst of volledig uitgeslagen?
- Is er nog ander letsel?
- Is er sprake van bloeding?

Beleid

Bij twijfel: overleg met de tandarts of laat de tandarts zelf het telefonisch consult doen.

Is de patiënt of ouder zeer verontrust: laat de tandarts zelf het telefonisch consult doen.

Tand uitgeslagen (avulsie)

Blijvende tand:

- Als de tand is gevonden: in melk of in de mond van patiënt of ouder bewaren.
- Patiënt direct naar de praktijk laten komen
- Tandarts informeren en praktijk voorbereiden op terugplaatsen tand.
- Patiënt(en) in wachtkamer informeren en/of patiënten afzeggen.
- Instrumentarium en spalkdraad klaarleggen (spalktray).

Melktand:

- Als de tand niet is gevonden: afspraak voor dezelfde dag geven.
- Als de tand wel is gevonden: overleg met tandarts of patiënt langs moet komen.

Tand verplaatst (luxatie)

Blijvende en melktand:

- Patiënt dezelfde dag, liefst zo snel mogelijk, een afspraak geven.

Stuk afgebroken (kroonfractuur)

Blijvende tand:

- Zo mogelijk voor dezelfde dag, maar in ieder geval binnen 24 uur, een afspraak geven.
- Als de lip kapot is: voor dezelfde dag een afspraak geven.
- Afgebroken deel: laten kijken of dit is te vinden.
- Als het stuk tand is gevonden: laten bewaren in water en meenemen naar de praktijk.

Melktand:

- Bij pijn of kapotte lip: voor dezelfde dag een afspraak geven.
- Anders: overleg met de tandarts.

Tand los

Blijvende tand:

Patiënt voor dezelfde dag een afspraak geven.

Melktand:

Overleg met de tandarts.

Bij pijn kan zonodig een advies voor pijnstilling worden gegeven.

Vervolgbehandeling

Afspraak wordt afgezegd:

- overleg met de tandarts hoelang een vervolgbehandeling maximaal kan worden uitgesteld.

Patiënt ziet af van vervolgbehandeling:

- overleg met de tandarts en draag zorg voor schriftelijke bevestiging onder verwijzing naar de risico's.

Tandletsel

