

Westerwolds raaigras



5 | 3

Westerwolds raaigras (*Lolium multiflorum*) is een eenjarig gewas met een vlotte beginontwikkeling, groeit snel, heeft een goede productie en is geschikt om te beweiden of om een snede gras van te oogsten.

Grondsoorten

Kan op alle grondsoorten verbouwd worden.

Zaaien

Vooral geschikt voor inzaai in de stoppel, groeit te hoog voor zaai onder dekvrucht. In open land zaaien tot eind september. Zaaizaadhoeveelheid: 30-45 kg per hectare. Zaaidiepte: circa 2 cm.

Beworteling

Intensieve beworteling, met name bovenste 10 cm.

Droge stof opbrengst

De totale droge stof productie kan oplopen tot 4000 kg

per hectare. Ongeveer 60 procent van de totale droge stof productie komt van bovengrondse delen. Effectieve organische stof: 1050 kg per hectare.

Vorstgevoeligheid

Is (weinig) vorstgevoelig.

Stikstofbemesting

De stikstofgebruiksnorm is 50 tot 60 kg N per hectare. Bij een mengsel met klaver en na gewassen die veel stikstof nalaten is stikstof bemesting niet nodig. Bij teelt als stikstof vanggewas na mais, is stikstofbemesting niet toegestaan.

Onkruidbestrijding

Is door de snelle groei meestal niet nodig. Eventueel zijn meerdere herbiciden beschikbaar.

Bijzonderheden

is een officieel stikstof vanggewas.

Aaltjes, bodemschimmels & bodemplagen

Aaltjes en tabakratelvirus (TRV)

Geen informatie beschikbaar

Bodemschimmels

Geen informatie beschikbaar



Bodemplagen

Westerwolds raaigras kan de kniptor sterk vermeerderen, waardoor de schade van de larve, de ritnaald, sterk kan toenemen. Ook problemen met emelten en slakken kunnen door Westerwolds raaigras (sterk) toenemen.