

Koeienvoer klas 2



Koeienvoer 2 op internet

https://maken.wikiwijs.nl/68036/Koeienvoer_2

Inhoud


Inleiding	3
Hoofdstuk 1: Ruwvoer beoordelen	4
1.1: Beoordelen graskuilanalyse	4
1.1.1: Conservering	4
1.1.2: Energie	14
1.1.3: Eiwit.....	17
1.1.4: Structuur en Snelheid	21
1.1.5: Smaak	27
1.2: Beoordelen graskuil in de praktijk	32
1.3: Beoordelen snijmaïs	37
Hoofdstuk 2: Ruwvoerbilans	51
2.1: Ruwvoer voorraad	51
2.2: Ruwvoer behoefte veestapel	56
Hoofdstuk 3: Voersnelheid	62

Inleiding

Bij het vak veevoeding in de tweede klas werken we uit het werkboek “Koeienvoer klas 2”. Daarnaast is er nog op internet de wikiwijs site “Koeienvoer klas 2”. Hier kun je nog meer achtergrondinformatie, video’s en presentaties vinden die ook tijdens de lessen aan de orde komen. Door op de onderstaande link te klikken ga je gelijk naar deze site toe.

https://maken.wikiwijs.nl/68036/Koeienvoer_2

Heb je deze link niet dan kun je het ook vinden via google.nl. Typ daarvoor in “wikiwijs koeienvoer klas 2”



Algemene informatie Veevoeding

- Opdrachten
- Rantsoenberekening
- Ruwvoer beoordelen
- Ruwvoerbilans
- Voersnelheid
- Voederwaardeprijzen
- Voerplan
- Voerstrategie
- Basisrantsoen
- Droogstand rantsoen
- Mineralenvoorziening
- Periode C
- Achtergrond
- Praktijkles
- OPA-opdracht

Algemene informatie Veevoeding

Heb je vragen of opmerkingen over dit arrangement, dan kun je deze mailen naar b.dejonge@nordwincollege.nl

Link naar Koeienvoer klas 1:

[Koeienvoer klas 1](#)

Documenten/artikelen

- [Handboek melkveehouderij, hoofdstuk 6 Veevoeding](#)
- [Veevoedertabel 2016](#)
- [Handboek melkveehouderij 2017/18](#)
- [Voeren met boerenverstand](#)
- [Brochure melkveevoeding \(Vlaanderen\)](#)



De lessen worden gegeven in periode A t/m C (2 lessen per week).

Het vak veevoeding in klas 2 telt mee met GO6. Zie onderstaande schema.

GO 6 Veehouderij OPA basis	Bodemkunde en bemesting	1. Toets bodem en bemesting 2. Presentatie
	Gezondheidsleer	3. Volg de koe
	Fokkerij	4. Fokkerij (OPA) 5. Veebeoordelen
	Veevoeding	6. Toets ruwvoer beoordelen en plannen 7. Toets voerstrategie, basisrantsoen en weiden + bijvoeding
	Grasland en voederwinning	8. Toets snijmaïsteelt 9.

Cijfer

Veevoeding 6: 75% cijfer toets + 25% cijfer stage opdracht veevoeding

Veevoeding 7: 100% cijfer toets

Hoofdstuk 1: Ruwvoer beoordelen

Als een groot deel van het ruwvoer is gewonnen, kan er weer een balans opgemaakt worden en moet er worden nagedacht over het voerplan voor het komende jaar. Welke kuil ga ik voeren aan de koeien en welke aan mijn pinken. En krijgt het jongvee jonger dan 9 maanden andere kwaliteit dan de oudere pinken. Voordat we hier een keuze in kunnen maken gaan we eerst het ruwvoer beoordelen.

1.1: Beoordelen graskuilanalyse

Voor het beoordelen van kuilgras kijken we naar onderstaande onderdelen. Afgekort = CEESSS

1. **C**onservering
2. **E**nergie
3. **E**iwit
4. **S**tructuur en **S**nelheid
5. **S**maak

1.1.1: Conservering

Om te beoordelen of de conservering bij het inkuilen goed is verlopen kijken we naar de volgende vijf punten.

1. Drogestof
2. Boterzuur
3. Melkzuur
4. Azijnzuur
5. NH₃-fractie

1. DS

Meest gewenste DS-gehalte van graskuil is tussen 35% en 45%. Een kuil met een DS-gehalte lager dan 35% heeft meer kans op boterzuur en een hoger NH₃-fractie. Beide zijn ongewenst. Terwijl een drogere kuil moeilijker is aan te rijden en gevoelig is voor broei.

2. Boterzuur

Hoe lager boterzuur is, des te beter. Boven de 3 is ongewenst. Vooral natte kuilen met een DS-gehalte lager dan 30% kunnen veel boterzuur bevatten.

Boterzuurbacteriën hebben veel vocht nodig om te overleven. Wanneer er vrij droog (> 45% DS) wordt ingekuuld, maken deze bacteriën weinig kans om te overleven.

Het nadeel van te veel boterzuur in de kuil zijn;

- Te hoog boterzuur in de melk. Van deze melk kan geen kaas meer gemaakt worden. De melkfabriek controleert dit regelmatig. Wanneer dit te hoog is volgt een korting.
- Boterzuur geeft een slechte smaak aan de kuil.

Voor meer info zie onderstaande link naar boterzuurtest.

<http://webapplicaties.wur.nl/software/Boterzuurtestfe/>

3. Melkzuur

In een goed geconserveerde kuil zetten melkzuurbacteriën suikers om in melkzuur. Hierdoor daalt de pH. Wanneer de pH laag genoeg is, gaan ongunstige bacteriën (boterzuur- en rottingsbacteriën) dood en stopt ook de activiteit van de melkzuurbacteriën. Het bacterieleven komt tot stilstand. Dit is het belangrijkste proces in een kuil om het gras te conserveren. Het vormen van melkzuur in de kuil gaat niet ten koste van de voederwaarde en ook niet van de smaak.

Wanneer de hoeveelheid melkzuur hoger is dan het streeftraject, dan kan dit duiden op een te langzaam verlopen conservering. Bijvoorbeeld wanneer er veel ruw eiwit (> 200 gram/kg DS) in het kuilgras zit. Eiwit neutraliseert het melkzuur, waardoor de pH in de kuil te langzaam zakt.

De optimale omstandigheden voor de melkzuurbacteriën zijn:

- Voldoende suiker
- Geen zuurstof
- Niet te veel eiwit (eiwit neutraliseert het melkzuur)

4. Azijnzuur

Azijnzuur wordt gevormd als het inkuilproces goed verloopt. Het is geen smakelijk zuur, maar is wel een zeer belangrijke factor bij het voorkomen van broei. Een graskuil met een laag aandeel azijnzuur is erg broeigevoelig. Azijnzuur, en indirect daarmee de pH, zijn te beïnvloeden door gras in te kuilen dat niet te droog is (< 40% DS) en daarnaast voldoende suiker bevat. Bacteriën die suiker omzetten in azijnzuur hebben water nodig om te overleven. Een droge kuil met een hoog suikergehalte, maar een gebrek aan vocht, zal weinig azijnzuur in geproduceerd worden. Meest gewenste streeftraject is tussen 10 en 20. Bij < dan 10 is de graskuil broeigevoelig en bij > 20 gaat het ten koste van de smaak.

5. NH₃-fractie

De ammoniak-fractie geeft aan hoeveel eiwit er tijdens het inkuilproces is omgezet in NH₃. Hoe hoger deze is des te slechter is het inkuilproces verlopen en is er veel eiwit verloren gegaan. Een kuil met veel NH₃ kan ook een teken zijn voor clostridia (schadelijke microbe). Deze zetten ook eiwit om in NH₃. Overigens in het in NH₃ omgezette eiwit nog wel benutbaar, maar niet zo hoogwaardig als de ruw eiwit variant.

De NH₃-fractie wordt als volgt berekend (zie voorbeeld kuilanalyse 1).

$$((\text{Ruw eiwit totaal} - \text{Ruw eiwit}) : \text{Ruw eiwit totaal}) \times 100\%$$

$$196 - 180 = 16 \text{ gram RE verloren}$$

$$16 : 196 \times 100\% = 8,2\% = \text{afgerond een NH}_3\text{-fractie (RE\%)} \text{ van } 8$$

Voorbeeld kuilanalyse 1: Aandachtspunten voor beoordeling van de conservering

	Resultaat product	droge stof	Streeftraject	Zand <15-6		Resultaat droge stof	Streeftraject	Zand <15-6
DS	462		300-500	461	Ruw as	93	90-120	100
pH	4,6		4,6-5,5		VCOS (%OS)	78,7	76-80	76,7
Boterzuur	0,6		< 3,0	1,7	NH ₃ -fractie (%RE)	8	< 7	8
Azijnzuur	14		10-20	12	Nitraat	4,2	< 7,5	4,5
Melkzuur	47		10-30	38	Ruw eiwit	180	160-190	170
VEM	438	949	880-940	908	Ruw eiwit totaal	196	170-210	186
VEVI	456	988	900-980	936	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	66	40-60	61
DVE+	30	66	60-80	64	Ruw vet	45	30-50	42
OEB+	30	66	40-80	57	Ruwe celstof	247	230-280	260
VOS	330	714	680-720	690	Suiker	90	80-140	70
FOSp+	272	589	525-600	557	NDF	463	420-500	499
OEB* 2 uur	34	74	40-95	66	NDFvert.br.hd(%NDF)	72,7	70-80	71,4
FOSp* 2 uur	136	294	225-300	252	ADF	263	240-290	280
Structuurwaarde	2,9		2,6-3,0	3,1	ADL	20	20-30	22
Verzadigingswrd.	1,01		0,95-1,10	1,04				

Hieronder volgen een aantal artikelen;

- Boterzuurattentie? Zo pakt u het aan (bron Eurofins)
- Melkzuur in de kuil zorgt voor hogere melkproductie (bron Eurofins)
- Onderschat het RAS-gehalte in ruwvoer niet (bron WUR)

Bron onderstaand artikel: Eurofins (april 2019)

Boterzuurattentie? Zo pakt u het aan

Het bijzondere groeiseizoen van 2018 heeft geleid tot meer boterzuurklachten. Vooral de 'hergroei' kuilen na de droogte zijn een bron voor problemen. Met de juiste maatregelen kunt u de besmetting bij de bron aanpakken en de boterzuurattentie voorkomen.

De extreem hoge ruw-eiwitgehalten in combinatie met hoge celwand-gehalten zaten een goede conservering vaak in de weg. Dit leidde tot veel kuilen met een hoge NH₃-fractie (>12) en een hoog boterzuurgehalte (>3,0). Dit is een indicatie voor een hoog risico op boterzuursporen. Echter kan het gebeuren dat de gemiddelde NH₃-fractie of boterzuurgehalte wel goed is, maar er toch sprake is van verhoogd boterzuur in de melk.

Breng de bron in kaart

Verhoogd boterzuur in de melk kan voorkomen als de kuil niet homogeen is, bijvoorbeeld als er een droge en natte partij over elkaar heen zijn gekuild of als de kuil niet homogeen verdeeld is (natte plukken). Broei kan ook een afwijkend beeld geven; dan is het gehalte boterzuur of ammoniak gemiddeld laag, maar kunnen er pleksgewijs wel veel sporen voorkomen.

Een andere risicovolle bron is bijvoorbeeld een droge kuil met een veel ruw as. Door gebrek aan vocht kunnen veel boterzuurbacteriën weinig zuur vormen, maar het probleem is nog wel aanwezig in het voer. Het probleem in de melk is namelijk niet het zuur dat door deze bacteriën geproduceerd wordt (hoewel het allesbehalve smakelijk is), maar de sporen (kiemen) van de bacterie zelf.

Focus op de sporen, niet het zuur!

De boterzuursporen kunnen op de spenen terecht komen via grond of mest. De besmetting via kuilvoer is dus indirect. Door het voeren van besmet kuilvoer komen de sporen in de mest terecht. In de stal komt deze mest mogelijk in contact met de spenen en komt het zo via het melken in de melk. Hygiënisch werken in de stal is daarom ook van cruciaal belang. Echter blijkt in 80% van de gevallen wel dat het ruwvoer de belangrijkste bron van de problemen is.

Kortom, bij de zoektocht naar de bron of bij risicovolle kuilen (< 30% DS) kunt u dus het beste onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van anaerobe sporen, niet het zuurgehalte. Eurofins Agro biedt dit onderzoek aan voor 30 euro en kan dit indien gewenst ook aanvullend bij een regulier kuilonderzoek uitvoeren. De kuilanalyse weergeeft dan de gemeten concentratie met de streefwaarde <10.000 kve.

Hoe voorkomt u een besmetting?

- Streef naar een percentage droge stof tussen de 35 en 50%
- Laat de kuil altijd hakselen bij minder gunstige omstandigheden
- Gebruik bij natte omstandigheden een inkuilmiddel
- Voorkom broei
- Laat de veldperiode niet te lang worden
- Stel machines goed af, zodat er zo min mogelijk grond (ruw as) in de kuil komt

Wat kunt u doen bij een besmette kuil?

- Probeer zo min mogelijk aan het melkvee te voeren
- Houd het rantsoenaandeel van de kuil laag als u het wel aan uw melkvee voert
- Werk extra hygiënisch in de stal (voorbehandeling, boxen schoonmaken, etc.)
- Werk extra netjes aan het kuilsnijvlak
- Voer geen rotte of schimmelende plekken

Bron onderstaand artikel: Eurofins (april 2013)

Melkzuur in de kuil zorgt voor hoge melkproductie

De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. En dat is jammer, want droger inkuilen gaat ten koste van melkzuur. Melkzuur levert een belangrijke bijdrage aan een hoge melkproductie.

Meestal wordt er bij de analysesresultaten van graskuilen vooral gekeken naar het suikergehalte. Hoe droger de kuil, hoe meer suiker. “Dit zorgt er al gauw voor dat we langer voordrogen en droger inkuilen”, stelt ir. René Knook van De Heus Voeders B.V. Dit gaat echter ten koste van melkzuur.

Onderzoek

In 2012 deed BLGG AgroXpertus samen met Barenbrug en De Heus Voeders B.V. onderzoek naar het belang van voldoende melkzuur en azijnzuur in graskuilen. Samen met In de gezamenlijke proef werden 40 kuilen met een vergelijkbare voederwaarde onderzocht. Conclusie: melkzuur draagt direct bij aan de melkproductie. “Melkzuur wordt namelijk door de koe omgezet in lactose, wat de melkproductie stimuleert”, vertelt Gerard Abbink. Hij is productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus. “Kuilen met een hoger melkzuurgehalte, zorgen voor een hogere melkproductie.”

Optimale percentage


Het meest optimale percentage droge stof voor een kuil ligt tussen de 35 en 45%. Dit percentage voorkomt bewaringsverliezen en zorgt ook nog eens voor een mooi melkzuurpercentage. Eén op de vier kuilen in Nederland heeft echter zelfs een droge stofpercentage van meer dan 50%.

Glucogene bron voor melkkoeien

René Knook van De Heus Voeders: “Hoog suiker vinden we goed en smakelijk voor de koe. We weten dat er een sterke relatie bestaat tussen droge stof en suiker. Hoe droger de kuil, hoe meer suiker.” Het is echter jammer dat droger inkuilen ten koste gaat van melkzuur. “Melkzuur wordt in de pens omgezet in propionzuur en is daarmee een volledig glucogene bron voor melkkoeien. Het is bekend dat het totaal aan glucose leverend vermogen (GLV) sterk bepalend is voor het productieniveau. Kuilen tussen 35 en 40% drogestof bevatten altijd zo'n 50 gram melkzuur per kg, terwijl dit bij kuilen richting 50% droge stof meer dan gehalveerd is.”

Prima gevulde pens

Maar te veel melkzuur zorgt toch voor pensverzuring? Dat wil je toch niet? Knook: "In de praktijk zien we juist dat de graskuilen met 35 tot 40% droge stof met een mooi aandeel melkzuur, in rantsoenen zorgen voor een extreem goede opname van droge stof per koe per dag. De koeien hebben dan een prima gevulde pens met veel ruwvoer, waardoor juist het gevaar op pensverzuring niet aan de orde is."



Vragen en opdrachten over conservering:

- 1) Wat is het gewenste DS-gehalte bij de conservering van kuilgras.

- 2) Welk nadeel heeft een te natte kuil bij de conservering.

- 3) Welk nadeel heft een te droge kuil bij de conservering.

- 4) Verklaar waarom droge kuilen relatief weinig last van boterzuur hebben.

Zie voor onderstaande vragen (5 t/m 10) het artikel; Boterzuurattentie? Zo pakt u het aan.

- 5) Verklaar dat door een hoog RE-gehalte in het kuilgras en veel celwanden, de kans op boterzuur verhoogd.

- 6) Noem drie omstandigheden waardoor er veel sporen van boterzuur in de graskuil kunnen zitten.

- 7) Hoe komen boterzuur sporen in de melk terecht.

- 8) Noem 6 aandachtspunten om een te hoog boterzuur in de kuil te voorkomen.

9) Wat kun je doen (5) als het boterzuur in de kuil te hoog is.

10) Doe de boterzuurtest voor je stage bedrijf. Gebruik hiervoor de onderstaande link.

<http://webapplicaties.wur.nl/software/Boterzuurtestfe/>

11) Wat is het nut van melkzuurbacteriën voor de conservering van graskuil.

12) Noem drie optimale omstandigheden van melkzuurbacteriën.

13) Verklaar dat bij een hogere DS-gehalte van de kuil er minder melkzuur wordt gevormd.

14) Beoordeel de hoeveelheid melkzuur van kuilanalyse voorbeeld 1 op bladzijde 5. Wat is hier waarschijnlijk gebeurt.

15) Hoe ontstaat een hoge NH₃-fractie in een graskuil tijdens de conservering.

16) Bereken de NH₃-fractie van de onderstaande kuilanalyse.

	Resultaat product		Streef- traject	Klei <15-6		Resultaat droge stof		Streef- traject	Klei <15-6
DS	339		300-500	427	Ruw as	111		90-120	106
pH	4,6		4,1-4,9		VCOS (%OS)	77,6		76-80	76,0
Boterzuur	5,3		< 3,0	2,1	NH ₃ -fractie (%RE)				
Azijnzuur	23		10-20	16	Nitraat	4,7		< 7,5	2,7
Melkzuur	58		30-70	38	Ruw eiwit	159		160-190	147
VEM	310	913	880-940	892	Ruw eiwit totaal	183		170-210	161
VEVI	321	946	900-980	919	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	72		40-60	63
DVE*	19	56	60-80	57	Ruw vet	43		30-50	41
OEB*	21	63	40-80	41	Ruwe celstof	261		230-280	269

17) Welke factoren werken een hoge NH₃-fractie in de hand.

Voorbeeld kuil analyse 2

	Resultaat product droge stof		Streef-traject	Gem. zomer		Resultaat droge stof	Streef-traject	Gem. zomer
DS	645		450-700	632	Ruw as	85	90-120	99
pH	5,8		5,4-6,5	5,6	VCOS (%OS)	73,5	72-76	71,3
Boterzuur	0,5		< 3,0	1,0	NH ₃ -fractie (%RE)	3	< 5	5
Azijnzuur	< 1		1-10	7	Nitraat	1,4	< 7,5	2,1
Melkzuur	9		5-10	13	Ruw eiwit	154	140-170	136
VEM	558	865	830-890	815	Ruw eiwit totaal	159	150-190	142
VEVI	568	881	840-920	822	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	36	40-60	45
DVE ⁺	48	75	60-80	62	Ruw vet	35	30-50	32
OEB ⁺	11	17	10-50	18	Ruwe celstof	248	230-280	269
VOS	434	673	640-680	642	Suiker	117	100-160	103
FOSp ⁺	342	530	500-560	519	NDF	523	460-540	540
OEB ⁺ 2 uur	14	22	15-65	29	NDFvert.br.hd(%NDF)	65,3	65-75	65,2
FOSp ⁺ 2 uur	141	218	210-260	215	ADF	275	250-300	294
Structuurwaarde	3,3		2,8-3,4	3,4	ADL	27	20-30	27
Verzadigingswrd.	1,02		0,95-1,10	1,07				

Voorbeeld kuilanalyse 3

	Resultaat product droge stof		Streef-traject	Zand najaar		Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand najaar
DS	502		300-500	494	Ruw as	133	90-120	** 121
pH	4,5		4,7-5,7		VCOS (%OS)	81,2	76-80	76,7
Boterzuur	1,0		< 3,0	1,7	NH ₃ -fractie (%RE)	8	< 7	8
Azijnzuur	9		10-20	12	Nitraat	5,5	< 7,5	4,6
Melkzuur	59		10-30	38	Ruw eiwit	218	160-190	192
VEM	474	944	880-940	888	Ruw eiwit totaal	236	170-210	208
VEVI	497	989	900-980	915	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	65	40-60	55
DVE ⁺	34	68	60-80	69	Ruw vet	43	30-50	40
OEB ⁺	54	108	40-80	75	Ruwe celstof	213	230-280	228
VOS	354	704	680-720	674	Suiker	60	80-140	74
FOSp ⁺	303	603	525-600	561	NDF	396	420-500	453
OEB ⁺ 2 uur	51	102	40-95	71	NDFvert.br.hd(%NDF)	77,2	70-80	69,6
FOSp ⁺ 2 uur	155	309	225-300	261	ADF	222	240-290	245
Structuurwaarde	2,5		2,6-3,0	2,9	ADL	15	20-30	21
Verzadigingswrd.	0,94		0,95-1,10	0,98				

1.1.2: Energie

Om te bepalen hoeveel energie er in het voer zit gebruiken we de VEM-waarde. Deze wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid verteerbare organische stof (VOS). VOS bestaat uit;

- Veteerbare koolhydraten (suiker, zetmeel, en celwanden)
- Veteerbare vetten
- Veteerbare eiwitten

Hoe hoger de VOS, des te hoger is de VEM. De verteerbaarheid van het ruwvoer, de vertering coëfficiënt (VCOS), speelt dus een belangrijke rol bij de hoeveelheid energie in een kuil. Het betekent ook dat het energiegehalte in kuilgras sterk kan worden beïnvloed door het oogstmoment. Ouder gras bevat meer celwanden en meer lignine. Dit geeft een lagere verteerbaarheid en dus een lagere VEM-waarde.

De streefwaarde van VEM is niet voor elke veehouder hetzelfde. De voermethode speelt daarbij een belangrijke rol. Wanneer er alleen kuilgras als ruwvoer met een kuilsnijder en blokkenwagen gevoerd wordt en daarnaast alleen brok in krachtvoerboxen, dan zal de veehouder een graskuil willen voeren met meer celwanden, die langzamer in de pens wordt afgebroken. Op deze manier worden pens stoornissen voorkomen. Een VEM-waarde van 880 à 900 VEM/kg DS kan dan ideaal zijn. Wanneer er TMR (Total Mixed Ration) wordt gevoerd met een voermengwagen, dan zal de veehouder in het algemeen eerder maaien, zodat er meer energie en meer ruw eiwit in de graskuil zit. Door dan meer structuur, Na_2CO_3 en of buffers (mineralenmengsel met gisten) door het rantsoen te mengen kunnen ook pens stoornissen worden voorkomen. Een VEM-waarde van 930 à 950 VEM/kg DS zal dus voor deze veehouder een streefwaarde kunnen zijn.

Hieronder volgen een aantal artikelen;

- Stop met hakselen 1.000 VEM kuilen (bron Veeteelt)
- ForFarmers vervangt VEM door MELK (bron Boerderij)

Bron: Veeteelt (november 2016)

Stop met hakselen van 1000 VEM kuilen

Om kuilen die 1000 VEM per kg droge stof bevatten, beter te laten benutten door de koe, is het verstandiger om deze niet te hakselen.

Volgens Sander van Zijderveld, hoofdonderzoeker herkauwers bij Provimi, lijken (voorjaars)graskuilen steeds meer op krachtvoer. 'Daarom is het belangrijk om de passagesnelheid van gras in pens te vertragen. Dat kan door gras langer in te kuilen of niet te hakselen. De deeltjesgrootte van gras speelt een belangrijke rol bij de energiebenutting uit gras', aldus Zijderveld tijdens een symposium in Hardenberg.

Nederlands gras uniek

Zijderveld stelt dat de Nederlandse graskwaliteit uniek in de wereld is en dat het VEM-niveau in de graskuilen al jarenlang stijgt. 'Ik ken geen land waar de graskwaliteit zo

hoog is. Omdat Nederlandse rantsoenen grasrijk zijn, is het belangrijk dat je wel zorgt voor een zo goed mogelijke benutting van het weidegras.'

Melkproductie valt tegen

De VEM-stijging van gras komt volgens Zijderveld doordat de NDF-gehalten (de niet-verteerbare celwanden) dalen en de verteringscoëfficiënt stijgt. Daardoor komt er meer energie vrij uit de celwanden. 'Toch valt de melkproductie bij het voeren van dit soort graskuilen niet altijd mee', aldus Zijderveld. 'De oorzaak is dat het gras te snel de pens passeert. Door te zorgen voor grotere grasdeeltjes in de pens, verhoog je de energiebenutting omdat het gras langer in de pens blijft.'

Bron: Boerderij (september 2010)

For Farmers vervangt VEM door Melk

For Farmers heeft een nieuw voederwaarderingssysteem geïntroduceerd onder de naam Melk. Met deze introductie neemt de mengvoerfabrikant afstand van het VEM-systeem (Voeder Eenheid Melk). Het systeem Melk staat voor Meer Energie voor Lacterende Koeien, en kent volgens de bedenker veel voordelen boven het bestaande VEM-systeem.

Het VEM-kengetal, dat al sinds de jaren '70 wordt gebruikt, kent volgens For Farmers een aantal nadelen. Zo kent het systeem energiewaarde toe aan eiwit en maakt het geen onderscheid tussen pens- en darmvertering. Onderzoek naar de werkelijke beschikbaarheid van voedermiddelen in de koe, de plaats van vrijkomen in de koe en de snelheid waarmee voedermiddelen in de koe beschikbaar komen bieden volgens For Farmer meer inzicht in de voedingswaarde van voer.

Vragen en opdrachten over energie:

18) Uit welke drie onderdelen komt de energie (VEM) uit graskuil vandaan.

a. Welke van de drie zorgt voor de meeste energie.

b. Welke van de drie hoort er eigenlijk niet bij.

19) Bekijk de twee graskuilanalyses op blz 13.

Verklaar waarom kuilanalyse 2 (bovenste) een lagere VEM heeft dan graskuilanalyse 3 (onderste), ondanks dat het suikergehalte van analyse 2 hoger is.

20) Hoe kun je de VEM in je graskuil beïnvloeden? Noem er minimaal 3.

21) Is iedere veehouder gebaad bij een VEM/kg DS > 950. Verklaar je antwoord.

22) De voerleverancier ForFarmers werkt niet met VEM, maar met de eenheid MELK. Wat is het verschil tussen VEM en MELK.

1.1.3: Eiwit

Graskuil is een goedkoop eiwitrijk voer. Hoe meer eiwit je van eigen land kan halen, des te minder eiwitrijk voer (als bijvoorbeeld soja) je hoeft aan te kopen. Net als de hoeveelheid VEM, wordt ook het ruw eiwitgehalte in graskuil beïnvloed door het maaimoment. Jong gras bevat meer eiwit dan ouder gras.

In het basisrantsoen (voer aan voerhek) streven we naar een ruw eiwitgehalte van 15 à 16%. Oftewel 150 à 160 gram ruw eiwit per kg DS. De streefwaarde voor ruw eiwit in een graskuil ligt tussen de 160 à 190 gram per kg DS. Dit hangt mede af van de hoeveelheid snijmaïs die er wordt gevoerd. Snijmaïs bevat weinig eiwit (RE = 6 à 7%). Hoe meer snijmaïs in het rantsoen des te meer ruw eiwit moet er in het kuilgras zitten.

Bij een kuilanalyse kijken we naar ruw eiwit en DVE. Darm Verteerbaar Eiwit bestaat namelijk uit verteerbaar bestendig eiwit en verteerbaar microbieel eiwit. De hoeveelheid microbieel eiwit is afhankelijk van onbestendig eiwit en pens energie (suiker, onbestendig zetmeel en fermenteerbare celwanden). In graskuil zit altijd een overschot aan onbestendig eiwit en in verhouding weinig pens energie, waardoor de pensmicroben niet al het onbestendig eiwit kunnen benutten. Dit zien we op de kuilanalyse aan de OEB. Een hoge OEB betekent dat er veel onbestendig eiwit niet door de pensmicroben opgenomen kan worden. Daardoor valt de DVE op een graskuil analyse wat lager uit. Door dit in het rantsoen te corrigeren met een energierijk voedermiddel, zoals bijvoorbeeld snijmaïs (OEB = negatief), zullen de pensmicroben meer onbestendig eiwit uit het kuilgras benutten, waardoor er dus een hoger DVE in het rantsoen zit.

Wanneer er alleen kuilgras als ruwvoer wordt gevoerd, zal de veehouder naar een hogere DVE willen streven. Dit is te realiseren door het gras later te maaien. Ouder gras heeft immers meer celwanden, waardoor het ruw eiwit langzamer afgebroken wordt. Het percentage onbestendig eiwit (eiwit afgebroken in de pens) zal lager zijn en het aandeel bestendig eiwit (afgebroken in de darm) zal toenemen. Op de kuilanalyse kun je hiervoor kijken naar "Oplosbaar ruw eiwit". Dit getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit binnen 2 uur in de pens wordt afgebroken.

De hoeveelheid oplosbaar ruw eiwit wordt naast het maaimoment onder andere ook bepaald door de bemesting en het DS-gehalte van de graskuil.

Bron: WUR (februari 2019)

Sturen op RE-gehalte in gras

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) stond het produceren van kwalitatief goed ruwvoer centraal. Door aangepaste bemesting en lagere normen is het ruw eiwitgehalte in graskuilen en weidegras afgelopen 20 jaar gedaald. Tijdens deze middag was er volop aandacht voor maatregelen die bijdragen aan het ruw eiwitgehalte in gras.

Knoppen om te sturen op RE

Op veel zandgronden vinden veehouders de ruw eiwitgehalten (RE) te laag worden, vaak in combinatie met snijmais in het rantsoen. In het westen op veengrond wil men graag een nog lager RE in de kuil, omdat hier vaak enkel gras gevoerd wordt. De belangrijkste knoppen om gericht te sturen op RE zijn de hoogte van de stikstofbemesting en het maaimoment. Hoe later je maait, hoe zwaarder de snede is, hoe lager het RE-gehalte. Voor een hoger RE-gehalte zou je juist meer N moeten bemesten, of eerder maaien. Jantine van Middelkoop presenteerde tijdens de jaarlijkse themadag van de Commissie Bemesting Grasland en Groenvoedergewassen (CBGV) enkele concrete handvatten om gericht te kunnen sturen.

4 gram RE per groeidag

Zij liet zien dat het RE-gehalte 3,5 tot 4,5 g/kg DS per groeidag verandert. Hoe hoger de N-bemesting en hoe zwaarder de snede, des te meer verandert het RE-gehalte per dag. Gemiddeld is 4 gr RE per groeidag een handige vuistregel. Als het gaat om bemesting dan verandert het RE grofweg 2/3x kg N/ha bij weidesneden en 1/2x kg N/ha bij maaisneden. Eerder maaien kost echter wel opbrengst. Later maaien levert meer opbrengst, maar een iets lagere voederwaarde. Voor een gelijke melkproductie moet een veehouder dan meer krachtvoer bijvoeren.

Sturen op RE-gehalten in de praktijk

Twee veehouders presenteerden na Van Middelkoop hoe hun RE-gehalten in de afgelopen 15 jaar zijn veranderd.

Henry Steverink, melkveehouder in het oosten van het land, heeft als streven om 12 ton DS smakelijk gras per ha met een RE van 200 te halen, omdat hij vrij veel snijmais combineert in het rantsoen. De knoppen waaraan hij de afgelopen 15 jaar heeft gedraaid om dit RE-gehalte te krijgen, zijn:

- Minder kunstmest N, 65-70 N,
- Later maaien voor een hogere opbrengst,
- Meer dierlijke mest (55-65 m³) uitrijden,
- Gedeelde N-gift met soorten kunstmest N, namelijk ASS en KAS. Strooien naar behoefte en per perceel.

Jan Vonk is melkveehouder in het veenweidegebied in het westen van het land. Hij stuurt op een gehalte van 160 RE, omdat hij enkel (kuil)gras voert. Hij heeft de afgelopen jaren aan de volgende knoppen gedraaid:

- Zijn drijfmestaanwending van begin februari naar half maart te verplaatsen,
- Minder kunstmest N; van 90 N naar 70 N maaien,
- Later te maaien met hogere opbrengst; 500 – 1000 kg DS/ha zwaardere snedes.
- Vanaf 2015 urean te spuiten. Daarmee kan hij 'vierkanter' bemesten, meer meststof op de juiste plaats.

Vragen en opdrachten over eiwit:

23) Zie twee graskuilanalyses op bladzijde 13. Vul onderstaande tabel in.

	Kuil analyse 2 (bovenste)	Kuil analyse 3 (onderste)
Ruw Eiwit		
Oplosbaar ruw eiwit		
OEB ⁺		
OEB ⁺ 2 uur		
DVE ⁺		

24) Waarom beoordelen we Ruw eiwit en niet Ruw eiwit totaal.

25) Wat moet het Ruw eiwit in een kuil analyse ongeveer zijn en waarvan hangt dit af.

26) Wat is het gemiddelde RE% in een basisrantsoen.

27) Welke DVE is het meest gewenst in een graskuil.

28) Waaruit bestaat DVE.

29) De OEB van "Voorbeeld kuilanalyse 3" is veel hoger dan van "Voorbeeld kuilanalyse 2". Wat betekent dat.

30) Verklaar dat "Voorbeeld kuilanalyse 2" een hogere DVE heeft dan "Voorbeeld kuilanalyse 3", ondanks dat er meer Ruw eiwit in analyse 3 zit.

31) Welke voermethode past het beste bij "Voorbeeld kuilanalyse 2" en welke bij "Voorbeeld kuilanalyse 3". Verklaar je antwoord.

32) Welke maatregelen kun je nemen om een hoger Ruw eiwit in je graskuil te krijgen.

33) Welke maatregelen kun je nemen om een hoger DVE-gehalte in je graskuil te krijgen.

1.1.4: Structuur en Snelheid

In het rantsoen moet voldoende structuur zitten. Bij te weinig structuur bestaat het rantsoen uit snel fermenteerbare voerdelen (veel VVZ in korte tijd → pH daling pens) en is de passage snelheid door de pens hoog, waardoor de kans bestaat dat niet alle voerdelen door de pensmicroben afgebroken kunnen worden.

Bij te veel structuur in het rantsoen zal de passage snelheid door de pens traag zijn, waardoor er minder kg DS opgenomen kan worden. Het is dus zoeken naar een juiste balans in het rantsoen tussen een hoge voeropname en een gezonde pens.

Bij structuur spreken we van chemische en fysische structuur. Bij de beoordeling van de kuilanalyse op papier kijken we alleen naar de chemische structuur. Bij het beoordelen van de graskuil in de praktijk kijken we ook naar de fysische samenstelling, zoals deeltjes lengte.

Bij de beoordeling van de structuur in de kuilanalyse kijken we naar;

- **Ruwe Celstof**
Het ruwe celstof-gehalte geeft een indicatie van de hoeveelheid celwanden in het voermiddel. De celwand bestaat uit structurele koolhydraten; ze geven structuur en stevigheid aan de plant. De belangrijkste celwandbestanddelen zijn: cellulose, hemicellulose, pectine en lignine.
Naar mate een gewas langer op het land staat zal het een relatief hoger ruwe celstof-gehalte bevatten en daarmee ook een hogere structuurwaarde en een hogere verzadigingswaarde hebben. Intensieve bemesting leidt daarentegen meestal tot een lager ruwe celstof-gehalte.
- **NDF**
Neutral detergent fibre (NDF) geeft het totaalgewicht aan celwanden weer. Daarmee kan bepaald worden hoe de verhouding is tussen celwanden en celinhoud. Het NDF-gehalte heeft een relatie met de melkproductie, omdat de tegenhanger celinhoud de meeste melkdrijvende componenten (eiwit, suikers) bevat. Het aandeel celwanden is te verminderen door het gras jong te maaien. Een koe heeft als herkauwer echter wel NDF nodig als structuurbron. Uit een deel van het NDF, de hemicellulose kan een koe ook melk produceren.
- **ADL**
De ACID Detergent Lignine (ADL) is het gedeelte van de plant dat helemaal niet verteerbaar is. Deze lignines verdwijnen via de mest weer. Ze hebben wel een waarde, lignines zorgen namelijk voor de voelbare prik in het rantsoen.
Wanneer alleen graskuil aan het voerhek wordt verstrekt, kunnen kuilen met een ADL vanaf 22 zonder toevoeging van extra structuur in het rantsoen, gevoerd worden.
- **Structuurwaarde**
Dit getal wordt bepaald door de ruwe celstof of de NDF van een graskuil.
Haksellengte wordt niet meegenomen, het gaat puur om de chemische samenstelling. Het geeft de prikkeling weer die de kuil in de pens veroorzaakt.

Bij de beoordeling van de snelheid van de kuil, dus hoe snel het in de pens gefermenteerd wordt en hoeveel VVZ er binnen korte tijd in de pens vrijkomen, zijn de volgende onderdelen van belang;

- FOSp⁺ 2 uur
FOSp⁺ 2 uur geeft een indicatie van de fermentatiesnelheid van gras in de eerste twee uur in de pens. Graskuilen met een FOSp⁺ 2 uur van > 300 zijn gevaarlijke kuilen die een risico vormen voor pensverzuring.
- FOSp⁺ 2 uur/FOSp⁺
Het verhoudingsgetal FOSp-2/FOSp zegt iets over de snelheid van een rantsoen; hoe hoger dit verhoudingsgetal, hoe sneller het rantsoen wordt gefermenteerd in de pens. Boven 0,5 is snel en onder 0,46 is traag. Gemiddeld zitten graskuilen rond 0,48.
- VCOS
Dit getal geeft aan hoeveel procent van het voermiddel in de koe verteert. Graskuilen met een VCOS > 80% zijn snel verteerbaar en geven een hoge VEM-waarde. Afhankelijk van de voermethode is een VCOS tussen 75 à 80% gewenst.

Bron = Eurofins (mei 2014)

Tips voor gezonde kuil met hoge voederwaarde

Jong maaien, laat maaien, droog of liever wat minder droog inkuilen? Iedere melkveehouder of adviseur heeft zijn eigen visie op hoe de ideale kuil tot stand komt. Maar wat is ideaal voor de koe? Aan de hand van nieuwe inzichten geeft BLGG AgroXpertus u vuistregels voor de praktijk.

Een gezonde kuil met een hoge voederwaarde; dat wil iedere melkveehouder. Een probleemloze melkproductie zorgt namelijk voor een goede efficiëntie en meer werkplezier. In de praktijk valt het echter niet mee om zo'n kuil te maken. BLGG AgroXpertus heeft met Penskarakter nieuwe metingen ontwikkeld die de pensbenutting van ruwvoerders in kaart brengen. Uit deze nieuwe metingen blijkt dat slechts 25% van de kuilen optimaal benut kan worden in de pens van de koe. Het merendeel is óf te traag óf te snel. Hier is dus nog veel winst te behalen!

Aan de hand van de nieuwe kijk op kuilen geeft BLGG AgroXpertus u handvatten om een optimale kuil te maken, met de juiste balans:

- Oogst u jong of erg goed verteerbaar materiaal? Kuil het product dan wat droger in (45-50% droge stof (DS)), zodat de verteringssnelheid wat geremd wordt en de koe de hoge voederwaarde goed kan benutten.
- Oogst u een wat zwaarder celwandrijk gewas? Kuil dan vooral niet te droog in (30- 40% DS). Dan wordt het structuurrijke product zo traag dat het de opname en melkproductie van de koeien zal remmen. Door het wat natter in te kuilen zorgt u ervoor dat het product, ondanks het hoge aandeel celwand, nog goed verteerbaar is en de kuil goed gevreten wordt.

Te grote belasting van de koe


Jong maaien, oud maaien, droog of nat? Niets is per definitie goed of fout. Het is vooral zoeken naar de juiste balans. Voor een hoge voederwaarde bijvoorbeeld, kun je het beste jong maaien. In de praktijk melken kuilen met 1000 VEM (voedereenheid melk) echter zelden zo goed als je op basis van de voederwaardecijfers zou verwachten. Deze kuilen zijn zo snel verteerbaar dat het de pens van de koe te veel belast, waardoor de benutting van het ruwvoer niet optimaal is. Uitstellen van het oogsttijdstip werkt in de praktijk vaak ook niet goed. Soms zit het weer net niet mee, waardoor je als melkveehouder het risico loopt dat je te lang moet wachten met maaien en het gras te ver doorgeschoten is. Resultaat: je hebt dan wel structuur, maar ook een trage kuil met weinig voederwaarde.

Invloed gehalte droge stof en maaimoment

Wat een koe écht kan met een kuil is in de praktijk belangrijker kan dan de hoogte van de voederwaarde. Met de nieuwe metingen waarmee BLGG AgroXpertus van iedere kuil de verteringssnelheid kan meten, is goed in te schatten hoe een kuil daadwerkelijk in de pens benut kan worden. Is hij te snel of te traag? Er zijn een aantal factoren die de snelheid kunnen beïnvloeden:

- **Het gehalte droge stof (DS)** -> Hoe lager het DS-gehalte, hoe meer suikers worden omgezet in melkzuur. Dit proces zorgt voor een snelle pH-daling van de kuil. Hoe lager het DS-gehalte, hoe lager de pH van de kuil dus. Deze zuren in de kuil zorgen er vervolgens voor dat de celwanden van het gras, bij wijze van spreken, al 'voorverteerd' worden. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat nattere kuilen een hoger gehalte NH-3 hebben, doordat er al meer eiwitten afgebroken zijn. In de pens van de koe worden nattere kuilen daarom veel makkelijker en sneller verteerd dan een droge kuil (zie figuur 1). Een natte kuil reageert totaal anders dan een droge kuil, ook al hebben ze dezelfde voederwaarde.
- **Maaimoment** -> De verteringssnelheid van een jong/licht gemaaide snede is veel hoger dan van een zwaar gemaaide snede met een vergelijkbaar bemestingsniveau. Dit komt doordat er meer 'verhouting' optreedt naarmate het gewas er langer staat, waardoor het moeilijker verteerbaar wordt.

invloed DS op celwandvertering



Vragen en opdrachten over structuur en snelheid:

34) Wat is het nadeel van te weinig structuur in het rantsoen.

35) Wat is het nadeel van te veel structuur in het rantsoen.

36) Waaruit bestaat NDF en waaruit bestaat ADL.

37) Bekijk de kuilanalyses (2 en 3) op blz 13. Beoordeel beide op structuur. Gebruik daarvoor de onderstaande tabel.

	Kuilanalyse 2	Kuilanalyse 3
Ruwe celstof		
NDF		
ADL		
Structuurwaarde		
Conclusie		

38) Op welke manier kun je de structuur in de graskuil beïnvloeden.

39) Op welke manier heeft de hoeveelheid structuur wat je in je graskuil wilt hebben te maken met de voermethode die je toepast.

40) Welke diergroepen moeten veel structuur in het rantsoen hebben. Verklaar waarom dit belangrijk is.

41) Wat verstaan we onder de FOSp⁺ 2 uur.

42) Uit welke bestanddelen bestaat de FOSp⁺ 2 uur.

43) Wat is een voordeel en een nadeel van een hoge en lage FOSp⁺ 2 uur.

44) Bereken van de kuilanalyses (2 en 3) op blz 13, het verhoudingsgetal FOSp-2/FOSp. Wat is je conclusie.

45) Vul de onderstaande tabel in.

	Langzaam	Snel
Ruwe celstof		
NDF		
ADL		
FOSp ⁺ 2 uur		
FOSp-2/FOSp		
VCOS		

46) Streep door wat niet van toepassing is *HOGER / LAGER*.

- a. Hoe meer structuur des te *HOGER / LAGER* is de VEM
- b. Hoe minder structuur des te *HOGER / LAGER* is de VOS
- c. Hoe meer structuur des te *HOGER / LAGER* is de passage snelheid in de pens
- d. Hoe meer structuur des te *HOGER / LAGER* is de hoeveelheid van bicarbonaat.
- e. Je kunt een graskuil sneller maken door met een *HOGER / LAGER* DS-gehalte in te kuilen.
- f. Hoe meer groeidagen het gras heeft, des te *HOGER / LAGER* is de afbraaksnelheid in de pens.

1.1.5: Smaak

Meest gewenste gehalten in een graskuil, die zorgen voor een goede smaak.

Goede smaak		Slechte smaak	
• Suiker	60 à 140	• Boterzuur	< 3
• Melkzuur	10 à 60	• NH ₃ -fractie	< 8
• Suiker + Melkzuur	125 à 150	• Ruw as	< 110
		• Azijnzuur	< 20

Aangezien melkzuur, boterzuur, azijnzuur en NH₃-fractie bij de conservering zijn besproken, wordt alleen “suiker” en ruw as extra toegelicht.

Suiker

Suiker is een indicatie voor de smakelijkheid van de kuil en draagt bij aan de energievoorziening. Dit betekent niet dat een kuil met een laag suikergehalte per definitie onsmakelijk is. De suikers dienen namelijk als brandstof tijdens de conservering en worden omgezet in melkzuur en azijnzuur. Melkzuur is een smakelijk zuur en een combinatie van een mooi suikergehalte en melkzuurpercentage geeft een smakelijke kuil.

Een heel hoog suikergehalte (bijvoorbeeld hoger dan 15% oftewel 150 gram/kg DS) verhoogt het risico op pensverzuuring.

Om het conserveringsproces succesvol te laten verlopen is een hoeveelheid suiker zeker gewenst. Het suikergehalte in het gewas is afhankelijk van diverse factoren. Bijv. het aantal zonuren draagt bij aan het aandeel suiker in het gewas, evenals een korte veldperiode. Een korte veldperiode houdt het meeste suiker in het gewas. Gras gemaaid in de avond bevat meer suiker dan gras gemaaid in de ochtend. Ook het droge stofgehalte bij inkuilen speelt een belangrijke rol; in droger gras hoeft minder suiker omgezet te worden in melkzuur om de kuil stabiel te krijgen. Daarnaast speelt het maaistadium een belangrijke rol. Oudere gewassen bevatten minder suiker en meer celwanden.

Ruw as

Ruw as, ook wel afgekort als RAS, is opgebouwd uit een aantal belangrijke mineralen. Zoals de belangrijke macro mineralen Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium en Fosfor. Daarnaast ook de Micro mineralen zoals Selenium, Zink, ijzer, Mangaan en alle overige mineralen welke onderzocht worden bij de ruwvoeranalyse en voor de voeding van belang zijn.

Afhankelijk van de bemesting en toestand in de bodem heb je hier al een belangrijke basis voor een 70 gram aan ruw as. Alleen al het K-gehalte in de kuil ligt vaak al boven de 30 gram. Dus een belangrijke aandeelhouder in het ruw as. Elke gram extra uit de Macro mineralen geeft ook direct één gram extra ruw as. Het overige bestanddeel komt met name voort uit verontreiniging met zand en grond. En dat aandeel loopt nogal eens te hoog op. Om grond in de kuil te voorkomen is het belangrijk om met juist afgestelde machines te werken. Te veel grond in de kuil gaat ten koste van de smaak, voederwaarde en voer opname.

Het ruw as in de kuil moet rond de 100 zijn (tussen 90 en 110).

Bron: WUR (december 2016)

Onderschat het RAS-gehalte in ruwvoer niet

Een hoog RAS-gehalte betekent in de praktijk vaak ruwvoer met een lagere VEM-waarde, een verhoogde NH₃ fractie, een lagere Ruw eiwit waarde en een lagere DVE waarde. Dit kan leiden tot een daling van de melkproductie. Welke maatregelen kunt u nemen om dit te voorkomen, zodat u niet hoeft te corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit.

In de Kringloop Wijzer hebben we te maken met twee keer het begrip RAS. Het ene staat voor het meest voorkomende ras van uw veestapel, de ander voor het Ruw AS-gehalte in uw ruwvoer. Uw huidige veestapel kunt u niet op korte termijn veranderen, maar u heeft wel invloed op het Ruw AS-gehalte, ofwel Anorganische Stof, in uw kuil. Dit getal wordt vaak weergegeven in gram per kilogram droge stof. De verschillen tussen de graskuilen zijn groot dit jaar, maar nog groter zijn de verschillen tussen de ondernemers onderling. Gemiddelden tussen 90 gram tot ruim 120 gram Ruw As per kilogram droge stof is dit jaar geen uitzondering. Wat is het effect van dit verschil van 30 gram per kilogram droge stof kuilgras?

Effecten van hoog Ruw AS

Het nadeel van een sterk verhoogd Ruw As gehalte in uw ruwvoer leidt tot lagere VEM-waarde, een verhoogde NH₃ fractie, een lagere Ruw eiwit waarde en een lagere DVE-waarde.

Deze effecten vertalen zich in een lagere omzetting naar melkproductie tenzij u dit gaat corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit.

Daarnaast treedt er in het ruwvoer meer verlies op tijdens de conservering wat een verhoogd NH₃ gehalte oplevert in het voer. Dit voer geeft bovendien meer aanleiding tot broei en een hoger boterzuurgehalte in de kuil, maar bovenal (bij sterk verhoogde vervuiling) tot risico op smaakafwijking van het voer. Ook bij een verontreiniging met mest neemt de smakelijkheid van het voer af. In praktijk denken veehouders vaak dat een verontreiniging met mest(resten) ook tot een verhoging van het Ruw As leidt, maar dit is niet het geval. Mest is organisch materiaal en verhoogt het Ruw As gehalte niet.

Corrigeren met extra voer

Om de negatieve effecten te compenseren kiezen veehouders voor aanvoer van "correctie" voer. Dit werkt negatief op de efficiëntie binnen de bedrijfskringloop. Extra aanvoer geeft uiteindelijk een slechter resultaat in Kringloop Wijzer. U voert tenslotte, naast energie, meer stikstof en fosfaat aan in uw bedrijf om door de dieren om te zetten tot een gewenste productie. Met als gevolg hogere verliezen aan stikstof en fosfaat per ton melk, per hectare en een lagere gewasopbrengst van het eigen land.

Maatregelen om RAS-gehalte te beperken

1. Vang tijdig uw mollen, zodat ze de komende maanden geen jongen meer voortbrengen en ook de grasmat niet meer kunnen beschadigen.
2. Probeer altijd rijshade in het veld te voorkomen. Spoorvorming leidt ertoe dat de machines, ondanks juiste afstelling, uiteindelijk het veld niet goed kunnen volgen als ze in sporen komen te rijden.
3. Stel de machines vlak op de "beton".
4. Stel ze werkelijk af, werkdiepte dus, in het veld.

5. Maai niet te kort, (> 6 cm) dan hoeven andere machines ook niet zo diep afgesteld te worden om het gewas op te rapen.
6. Ga ook zelf in het veld kijken als de loonwerker aan het werk is. Dit geeft de juiste informatie en geeft ook een goede communicatie.

Vragen en opdrachten over smaak:

47) Onder welke weersomstandigheden komt er veel suiker in het gras.

48) Kan het suikergehalte in kuilgras ook te hoog zijn. Verklaar je antwoord.

49) Hoe kun je meer melkzuur in graskuil krijgen.

50) Wat zit er allemaal in RAS.

51) Waar bestaat het grootste deel van RAS uit?

52) Hoe hoog mag RAS zijn? En kan het ook te laag zijn? Verklaar.

Lees voor het maken van de twee onderstaande vragen het artikel; Onderschat RAS in ruwvoer niet.

53) Wat is het nadeel van een te hoog RAS-gehalte.

54) Noem zes maatregelen die je kunt nemen om een te hoog RAS-gehalte in je graskuil te voorkomen.

55) Beoordeel de smaak van de kuilanalyses (2 en 3) op blz 13. Wat is je conclusie.

Kuil 2:

Kuil 3:

1.2: Beoordelen graskuil in de praktijk

Bij het beoordelen van graskuil in de praktijk zijn de volgende onderdelen van belang;

1. DS-gehalte

De ideale DS-gehalte bij inkuilen is in paragraaf 1.1.1 “Conservering” al besproken. Ook in het artikel “Tips voor een kuil met hogere voederwaarde” is de relatie tussen passage snelheid van het voer door de pens, in relatie met de DS-gehalte, aan de orde geweest. Natte voerdeeltjes zijn zwaarder en ze zijn sneller verzadigd met water, waardoor het sneller in de pens naar beneden zakt en afgevoerd wordt naar de boekmaag. Let op, de passage snelheid kan ook te snel gaan.

Het DS-gehalte op een analyse formulier is het gemiddelde van een hele kuil. Er kan per laag of per ingekuilde snede verschillen zitten in het DS-gehalte. Het is daarom belangrijk dat je ook zelf een inschatting kunt maken van het DS-gehalte. Ook door weersinvloeden (warm of regen) kan bij het uitkuilen het DS-gehalte veranderen. Voer je normaal gesproken aan 100 koeien 2.500 kg graskuil met 40% DS (= 10 kg DS/koe/dag), als je deze zelfde hoeveelheid van 2.500 kg afweegt bij veel regenwater in de kuil en het DS% is dan bijvoorbeeld 37%, dan voer je per koe 9,25 kg DS ($2.500 \text{ kg} \times 37\% = 925 \text{ kg DS} : 100 \text{ koeien}$). Bij een gemiddelde voederwaarde van 930 VEM/kg DS, is dit 700 VEM ($930 \text{ VEM} \times 0,75 \text{ kg DS lagere opname}$) per koe minder. Wat al gauw uitkomt op 1,5 kg melk ($700 \text{ VEM} : 460 \text{ VEM per kg meetmelk}$) minder uit ruwvoer.

2. Lengte deeltjes

Kuilgras moet minimaal een lengte van 2 à 3 cm hebben, wil het van nut zijn voor de vaste voerlaag in de pens (= pensmatras). Een goede pensmatras is van belang voor;

- Goede fermentatie,
- Juiste passage snelheid in de pens (niet te snel en niet te langzaam)
- Genoeg pensbewegingen.

Wanneer de voerdelen van graskuil te lang zijn (> 10 cm) zal het aanrijden tijdens het inkuilen moeilijkere verlopen. Daarnaast zal bij te lang gras de voer opname lager zijn. Er is aangetoond dat van normaal gehakselde graskuil (afstelling hakselaar deeltjeslengte van 2 tot 3 cm) 10 tot 20% meer wordt opgenomen dan van lange graskuil.

Het voordeel van gehakseld kuilgras is,


- Betere toegankelijkheid voor de pensmicroben,
- Hogere voeropname,
- Hogere verteerbaarheid,
- Hogere energiewaarde, terwijl de structuurwaarde nagenoeg niet lager is.

Bij het gebruik van een opraapwagen zijn een groot aantal scherpe messen dan ook aan te bevelen.

3. Blad, stengel en bloeiwijzen

De meeste voederwaarde zit in het blad. Ook zijn de celwanden in het blad makkelijker afbreekbaar voor de pensmicroben.

Zodra het gras in de bloei schiet, weten we dat de hoeveelheid ruwe celstof (structuur) toeneemt en dat de hoeveelheid VEM en RE-gehalte naar beneden gaat. Helemaal geen structuur (prik) is ook weer niet wenselijk i.v.m. herkauwactiviteit en (te snelle) passage snelheid door de pens.



Bron: Onderzoek Barenbrug Research i.s.m. Wageningen Universiteit

4. Kleur van de kuil en ruw eiwit

De kleur van een graskuil zegt iets over de hoeveelheid RE en over hoe nat het is ingekuild.

In blad zit naar verhouding meer RE dan in de stengel. Blad heeft een donkerder kleur en stengels zijn lichter van kleur.

Hoe droger de kuil, des te lichter is de kleur. Om dus een schatting te geven van de hoeveelheid RE in een kuil, moet je dus rekening houden met het DS-gehalte.

5. Geur

Hoe lager het DS-gehalte in de kuil, des te meer melkzuur er wordt gevormd. Zie paragraaf 1.1.1 over conservering. Natte kuilen (< 40% DS) die goed zijn geconserveerd hebben ruiken zoet/zuur. Droge kuilen ruiken juist iets zoeter. Bij aanwezigheid van schimmel gaat de goede geur verloren.

6. Broei en schimmel

De temperatuur in een graskuil is dezelfde temperatuur als op de dag van inkuilen. Wanneer de temperatuur in de kuil hoger is, dan spreken we van broei. Bij broei gaat er veel suiker (VEM) en geur/smaak verloren. Daarnaast hebben schimmels een negatief effect op de pensmicroben. Het is daarom beter om dit niet mee te voeren, maar om dit af te voeren naar de mestbult.

Vragen en opdrachten bij beoordelen graskuil in de praktijk

Beantwoord de onderstaande vragen met behulp van o.a. de video “Beoordelen eigen ruwvoer door Aart Malestein” (tot 5 minuten). Zie ook onderstaande link.

<https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=68036#!page-5355942>

57) Hoe lang moet het gras in de graskuil gesneden of gehakseld zijn.

58) Wat is het nadeel van te kort gesneden graskuil.

59) Wat is het nadeel van te lang graskuil.

60) In welke snedes kuilgras vind je over het algemeen meer blad en in welke sneden in verhouding meer stengel. Verklaar hoe dat komt.

61) Wat is de meest ideale DS-gehalte in graskuil

62) Bij wat voor DS-gehalte kun je beter inkuilen als het een zware snede is (> 4.000 kg DS/ha). Verklaar je antwoord.

63) Van een melkveebedrijf zijn de volgende gegevens bekend;

- 140 melkkoeien
- 4.600 kg kuilgras per dag gevoerd
- DS-gehalte op de kuilanalyse is 42%
- Voederwaarde kuilgras is 920 VEM/ kg DS
- Werkelijke DS-gehalte is 38% DS (bepaalt met droogstoof)

Bereken hoeveel VEM/koe/dag er minder wordt opgenomen uit ruwvoer. Reken dit tevens om naar kg meetmelk.

64) Streep door wat niet van toepassing is.

Hoe meer blad, des te *DONKERDER* / *LICHTER* is de kleur en des te *MEER* / *MINDER* ruw eiwit zit er in het kuilgras.

65) Wat gebeurt er met wat droger (> 50% DS) kuilgras in de pens. Wat doet dit met de fermentatie.

66) Welk verschil in geur kun je waarnemen tussen een nattere kuil (< 40% DS) en een drogere kuil (>45% DS). Verklaar je antwoord.

67) Noem drie nadelen van broei in de kuil.

68) Wanneer spreken we van broei.

69) Hoe kun je broei voorkomen.

1.3: Beoordelen snijmaïs

Snijmaïs is na gras het belangrijkste ruwvoer in de melkveehouderij. Het succes van snijmaïs als voedergewas is mede te danken aan een hoge en constante voederwaarde (VEM) en snijmaïs past goed in een melkveerantsoen naast gras.

Negatieve OEB

In gras zit naar verhouding veel onbestendig eiwit (OEB = positief) en in snijmaïs juist weer meer pens energie (OEB = negatief). Dus door snijmaïs naast kuilgras of vers gras te voeren, zal het onbestendig eiwit in gras meer omgezet worden in microbiëel eiwit, wat weer een hoger DVE geeft en dus ook weer een hoger eiwit% in de melk. Zo draagt snijmaïs, wat weinig eiwit bevat (6 à 7%), toch bij aan een hoger eiwitgehalte in de melk.

Veel zetmeel

Snijmaïs wordt vooral gevoerd omdat het veel VEM (energie) bevat. Deze energie is met name afkomstig uit koolhydraten. Het belangrijkste koolhydraat in snijmaïs is zetmeel, afkomstig uit de kolf. Het zetmeelgehalte varieert afhankelijk van het ras en het afrijpingsstadium. Bij een normaal ontwikkeld gewas snijmaïs (met 28 à 35% DS) kan het zetmeelgehalte variëren tussen de 250 en 400 gram zetmeel per kg DS. De niet-structurele koolhydraten kunnen op basis van de snelheid van afbreekbaarheid en de plaats van afbraak in het maagdarmkanaal worden opgedeeld in verschillende fracties. Ten eerste zijn er suikers en snel afbreekbaar onbestendig zetmeel (SUSAZ). Daarnaast kan een deel van het zetmeel worden gerekend tot het langzaam afbreekbaar onbestendig zetmeel (LAOZ). Dit zetmeel wordt in de pens relatief langzaam afgebroken tot propionzuur. Het bestendige zetmeel (BZET) ontsnapt aan de afbraak in de pens en komt in de darm beschikbaar als glucose.

In vergelijking met de meeste andere zetmeelrijke voeders verloopt bij snijmaïs de afbraak van zetmeel een stuk trager (zie onderstaande tabel). Ongeveer 65 tot 80% van het zetmeel uit snijmaïs beschouwen we als langzaam afbreekbaar onbestendig zetmeel (LAOZ) dat wordt afgebroken in de pens; ongeveer 20 tot 35% van het zetmeel is bestendig zetmeel (BZET) dat de pens onverteerd passeert. Het zetmeel van snijmaïs bestaat vrijwel volledig uit LAOZ en BZET.

Afbraaksnelheid van zetmeel in voedermiddelen in vergelijking tot snijmaïs. Afbraaksnelheid (%/uur)

Snijmaïs	7,9
Maïskolvensilage	7,7
Corn Cob Mix	7,2
Maïs (korrel)	4,0
Gerst	21,3
Tarwe	18,2

¹⁾ De afbraaksnelheden zijn gemiddelde waarden op basis van een reeks van onderzoeken. Deze getallen moeten worden gezien als een indicatie voor de rangordeverschillen tussen voedermiddelen.

Nieuwmelkte- en oudmelkte koeien

Omdat snijmaïs veel zetmeel bevat, past het goed in het rantsoen van nieuwmelkte koeien. De pensmicroben zetten onbestendig zetmeel om in propionzuur. Dit wordt via de penspapillen opgenomen in het bloed. Aangekomen bij de uier wordt het weer omgezet in melksuiker. Het gemiddelde melksuiker gehalte in melk is altijd tussen 4,5 à 4,6%. Hoe meer melksuiker er wordt aangemaakt, des te meer melk zal de koe produceren.

Oudmelkte koeien die veel maïs gevoerd krijgen, zullen niet al het propionzuur omzetten in melksuiker. Deze koeien zullen bij een overschot aan zetmeel, gaan vervetten. Een koppel koeien met een redelijk aandeel aan snijmaïs in het rantsoen is daarom ook beter in conditie dan een veestapel die alleen kuilgras in het rantsoen heeft.

Vorming van melkbestanddelen uit het voer

Voerbestanddeel	Plaats van vertering		Soort nutriënt	Gebruikt voor melkbestanddeel
	Pens	Darm		
<i>Structurele koolhydraten</i>				
Cellulose	Azijnzuur	-	Ketogeen	Melkvet
Hemicellulose	Azijnzuur	-	Ketogeen	Melkvet
Pectine	Propionzuur	-	Glucogeen	Lactose
<i>Niet-structurele koolhydraten</i>				
Suikers	Boterzuur/propionzuur	-	Ketogeen/glucogeen	Melkvet/Lactose
Zetmeel	Propionzuur	Glucose	Glucogeen	Lactose
Fructosanen	Boterzuur	-	Ketogeen	Melkvet
Eiwit	Microbieel eiwit	Aminozuren	Aminogeen/glucogeen ¹	Eiwit/Lactose
Vet	Triglyceriden/Vetzuren	Triglyceriden/Vetzuren	Ketogeen	Melkvet

¹ Een deel van de aminozuren is glucogeen en kan worden omgezet in glucose

Vet

Snijmaïs bevat weinig vet, ongeveer tussen de 30 en 40 gram per kg DS (= 3 à 4%). Vet uit snijmaïs levert dus maar een geringe bijdrage aan de vorming van melkbestanddelen.

Arm aan mineralen

Omdat snijmaïs arm is aan mineralen moet dit worden aangevuld uit andere voeders in het rantsoen (krachtvoerders) of losse mineralenmengsels. Een laag mineralengehalte kan ook voordelen hebben. Bij aankoop van ruwvoer in de vorm van snijmaïs worden weinig mineralen aangevoerd.

Omdat de gehalten aan kalium en ruw eiwit laag zijn, wordt magnesium uit snijmaïs beter geabsorbeerd. Doordat snijmaïs ten opzichte van gras(kuil) weinig kalium bevat, is het kation-anion verschil (KAV) van snijmaïs veel lager dan van graslandproducten. Een laag KAV tijdens de droogstand stimuleert de mobilisatie van calcium uit het skelet, waardoor de kans op melkziekte verkleint. Snijmaïs in een droogstandsrantsoen kan daarom zinvol zijn. Maar omdat snijmaïs een energierijk product is, is het ook nodig tegelijkertijd een energiearm product als stro in het rantsoen op te nemen.

Aanbevolen mineralen in het rantsoen en aanwezige mineralengehalten in snijmaïs en graskuil

	Aanbevolen gehalte per kg droge stof	Gehalten in snijmaïs per kg droge stof	Gehalten in graskuil per kg droge stof
Calcium (g)	3,5 – 5,5	1,6	5,4
Fosfor (g)	3,0 – 3,5	1,9	4,1
Natrium (g)	1,0 – 1,5	0,2	2,7
Magnesium (g)	2,0 – 5,0	1,3	2,5
Kalium (g)	8	13	37
Chloor (g)	3,5	1,3	12
Zwavel (g)	-	1,0	2,8
Jodium (mg)	0,6	0,1	0,2
Mangaan (mg)	25	32	101
Zink (mg)	25	38	46
IJzer (mg)	-	152	532
Koper (mg)	10	3,6	8,5
Molybdeen (mg)	-	0,5	2,2
Cobalt (µg)	100	59	239
Selenium (µg)	150	23	49
KAV (meq)	-	230	560
Vitamine A (IE)	2000 – 5000	-	-
Vitamine D (IE)	300 – 500	-	-

Bron: CVB en PV

Hogere DS-opname

Snijmaïs heeft ten opzichte van de meeste andere gangbare ruwvoerders een lagere VW. Snijmaïs (VW = 0,8) legt dus minder beslag op de voeropnamecapaciteit (VOC) dan een gemiddelde graskuil (VW = 1,0). Een deel van de graskuil vervangen door snijmaïs kan leiden tot een hogere DS-opname en energieopname. Dit blijkt wanneer de voederwaarde wordt uitgedrukt in gehaltenes per VW-eenheid in plaats van gehaltenes per kg DS (zie onderstaande tabel).

Voederwaarde	Per kg droge stof		Per VW-eenheid	
	Snijmaïs	Graskuil	Snijmaïs	Graskuil
Verzadigingswaarde (l/kg ds)	0.83	1.00	-	-
VEM	937	890	1130	890
DVE (g)	47	75	57	75
OEB (g)	-28	32	-34	32

Structuur

De structuurwaarde van snijmaïs is afhankelijk van het celwandgehalte (NDF en ruwe celstof) en de haksellengte. Een hoger celwandgehalte en een grotere haksellengte gaan gepaard met een hogere structuurwaarde. Een toename van de theoretische haksellengte met 1 mm leidt tot een 2% hogere structuurwaarde. Wanneer men een gebrek aan voldoende structuur in het rantsoen verwacht, lijkt het gunstig om snijmaïs grof te hakselen (> 10 mm). Uit onderzoek is gebleken dat grof hakselen inderdaad kan leiden tot meer kauwactiviteit per kg DS, een langere totale kauwtijd of tot een verschuiving tussen eet-

tijd en herkauwtijd. Echter, de effecten op de totale kauwactiviteit (eet-tijd + herkauwtijd) zijn gering, omdat een grotere haksellengte vaak gepaard gaat met een lagere DS-opname. Grof hakselen heeft nauwelijks of geen invloed op de pens fermentatie, de pH in de pens en de concentraties van vluchtige vetzuren. Er zijn dus geen aanwijzingen dat een verhoogde kauwactiviteit leidt tot een grotere buffering van de pH in de pens en een betere pens fermentatie. Daarentegen worden voederverliezen groter bij een langere haksellengte, omdat de koeien vooral de celwandrijkere delen laten liggen (spildelen en schutbladeren). Bij grover hakselen wordt vaak een betere celwandverteerbaarheid waargenomen, maar dit voordeel wordt tenietgedaan door een veel slechtere verteerbaarheid van zetmeel en de grotere verliezen van zetmeel en korreldelen in de mest. Fijn hakselen (6 – 8 mm) daarentegen leidt tot een betere verteerbaarheid en benutting van de voedingsstoffen van de snijmaïs. Dit heeft weer positieve gevolgen voor de melkproductie. Uit onderzoek concluderen we dat grof hakselen van snijmaïs nauwelijks effect heeft op de structuurvoorziening en pens fermentatie, maar dat voeropname, voederverliezen en melkproductie nadelig worden beïnvloed. Bovendien zijn grof gehakselde kuilen veel broeigevoeliger dan fijn gehakselde kuilen.

Beoordelen kuilanalyse snijmaïs

Onderdeel	Kengetal	Streefwaarde
Conservering	Droge stof Melkzuur NH ₃ -fractie pH	35 à 40% DS 40 à 60 < 6 3,8 à 4,2
Energie	VEM Zetmeel	950 à 1.000 350 à 400
Structuur	Ruwe celstof NDF	180 à 200 320 à 400
Snelheid	FOSp2 % bestendig zetmeel hoog % bestendig zetmeel laag	240 à 285 > 30 (langzamer) < 28 (sneller)

Beoordelen snijmaïs in de praktijk

Onderdeel	Beoordeling
Haksellengte	6 à 8 mm
Kleur	Groen (vroeg gehakseld, minder rijp) Lichter (meer afgerijpt)
Aandeel korrels	Meer korrels = meer VEM en hoger DS%
DS en zetmeel	Hoe hoger DS, des te hoger zetmeel
Bestendigheid zetmeel	Korrel in kleinere (3 à 4) stukken (onbestendiger) Korrel in 1 à 2 stukken (bestendiger)
Voelen, zegt iets over VCOS	Zacht is hogere VCOS (> 77%) Houtiger, meer prik is lagere VCOS (<76%)
Geur/smaak	Fris (= smakelijker) Zuur (onderin) gele kleur, onbestendiger Schimmel/rotting

Voorbeeld snijmaïs analyse 1

Onderzoek-/ordernummer:
Oogstdatum:

28-09-2018

Kopiehouder:

	Resultaat product	droge stof	Streeftraject	Gemiddelde		Resultaat droge stof	Streeftraject	Gemiddelde
DS	395		320-360	367	Ruw as	32	35-50	35
pH	4,0		3,8-4,2	3,9	VCOS (%OS)	76,8	73-78	76,4
Azijnzuur	15		10-16	11	NH ₃ -fractie (%RE)	9	< 6	7
Melkzuur	53		40-60	50	Ruw eiwit	68	75-85	65
VEM	393	994	920-1000	985	Ruw eiwit totaal	74	80-90	70
VEVI	411	1041	950-1030	1031	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	53	42-60	55
DVE ⁺	22	55	45-60	53	Ruw vet	36	25-35	33
OEB ⁺	-16	-41	-40 - -20	-42	Ruwe celstof	158	180-200	173
VOS	293	743	700-750	738	Suiker	12	1-15	14
FOSp ⁺	210	531	505-555	535	Zetmeel	401	320-400	374
OEB ⁺ 2 uur	-2	-4	-10 - 0	-4	Best.heid zetmeel(%)	33	25-34	27
FOSp ⁺ 2 uur	101	255	240-285	259	Bestendig zetmeel(g)	134	70-120	100
Structuurwaarde	1,5		1,7-2,0	1,6	NDF	344	370-420	360
Verzadigingswrd.	0,87		0,79-0,82	0,84	NDFvert.br.hd(%NDF)	56,1	40-60	52,3
					ADF	180	190-220	200
					ADL	17	14-20	16


Toelichting uitslag t.o.v. streeftraject

Vrij laag Vrij hoog Hoog Gevaar
Laag laag hoog Hoog Gevaar op pag. 2



Advies

Figuur 1: Penskarakter



▲ Monstername
● Na 6 mnd

Verloop bestendig zetmeel	Resultaat %	g/kg DS
bij monstername	33	134
na 3 maanden	27	108
na 6 maanden	23	91
na 9 maanden	20	81
Totale afname	13	

Voorbeeld snijmaïs analyse 2

Onderzoek-/ordernummer: XXXXXXXXXX
 Oogstdatum: 28-09-2017


	Resultaat product	droge stof	Streeftraject	Gemiddelde		Resultaat droge stof	Streeftraject	Gemiddelde
DS	335		320-360	363	Ruw as	35	35-50	35
pH	3,9		3,8-4,2	3,9	VCOS (%OS)	78,3	73-78	76,6
Azijnzuur	10		10-16	11	NH ₃ -fractie (%RE)	9	< 6	7
Melkzuur	54		40-60	48	Ruw eiwit	63	75-85	65
VEM	340	1015	920-1000	988	Ruw eiwit totaal	69	80-90	70
VEVI	358	1070	950-1030	1035	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	58	42-60	55
DVE+	19	56	45-60	53	Ruw vet	37	25-35	33
OEB+	-15	-45	-40 - -20	-42	Ruwe celstof	165	180-200	175
VOS	253	756	700-750	739	Suiker	< 12	1-15	14
FOSp+	189	563	505-555	536	Zetmeel	390	320-400	369
OEB+ 2 uur	-3	-8	-10 - 0	-4	Best.held zetmeel(%)	22	25-34	28
FOSp+ 2 uur	97	291	240-285	259	Bestendig zetmeel(g)	88	70-120	104
Structuurwaarde	1,5		1,7-2,0	1,6	NDF	344	370-420	363
Verzadigingswrđ.	0,79		0,79-0,82	0,83	NDFvert.br.hd(%NDF)	56,7	40-60	53,2
					ADF	195	190-220	201
					ADL	15	14-20	16

Toelichting uitslag t.o.v. streeftraject



Advies

Figuur 1: Penskarakter



▲ Monstername
● Na 6 mnd

Verloop bestendig zetmeel	Resultaat %	g/ kg DS
bij monstername	22	88
na 3 maanden	21	84
na 6 maanden	21	81
na 9 maanden	20	79
Totale afname	2	

Kritiek op bestendig zetmeel in snijmaïs

Hoogproductieve melkkoeien lijken niet zonder snijmaïs te kunnen. Maar een overmaat aan bestendig zetmeel en een ongunstige vetzuursamenstelling maken het tot een ongezond voedermiddel. Boeren zouden het aandeel snijmaïs moeten beperken tot maximaal een kwart van het rantsoen.

Snijmaïs is in het overgrote deel van de Nederlandse melkveerantsoenen een vast en belangrijk onderdeel. Logisch. Het gewas kan hoge opbrengsten halen, heeft een voorspelbare en hoge voederwaarde en vormt een mooi middel om een grasrantsoen in balans te brengen. Maar maïs als voer heeft voor de gezondheid van koeien ook nadelen.

Darmvertering tegennatuurlijk

De kracht van maïs is de grote hoeveelheid zetmeel die de kolf kan produceren. De rest van de plant is eigenlijk ballast voor de koe, al wordt geprobeerd met veredeling de vertering van de restplant te verbeteren. In de veredeling van snijmaïs is de laatste jaren daarom veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 'stay green' rassen. Deze maken het mogelijk om de plant langer door te laten groeien en droger in te kuilen. Daardoor bevat het meer zetmeel wat ook nog eens bestendiger is, dat wil zeggen dat het zetmeel de vertering in de pens van de koe ongeschonden passeert en pas op darmniveau beschikbaar komt.

Koeien die aan het eind van de lactatie te veel maïs krijgen, gaan vervetten. De opbouw en afbraak van vet is belastend voor de lever en de gezondheid van de koe. Bovendien geeft veel zetmeel de koe een verzadigd gevoel waardoor ze lui wordt. Robotmelkers weten dat ze niet te veel maïs moeten voeren om de dieren actief te houden.

Ook schimmels in de maïskuil kunnen gevaarlijk zijn. Omdat de pens van de koe veel op kan vangen, zal ze daar niet zo snel zichtbaar ziek van worden, maar het kan het immuunsysteem van het dier wel belasten."

Amylose en amylopectine

Op zich zou je deze nadelen met goed management kunnen ondervangen. Maar er speelt meer. Het bestendig zetmeel in maïs bestaat uit amylose en amylopectine. De verhouding tussen deze twee is afhankelijk van de groeiomstandigheden tijdens de kolfzetting en afrijping. Hoe gelijkmatiger deze verloopt, hoe meer amylose er wordt gevormd. Is er in deze fase echter weinig zon, vormt de plant daardoor weinig suikers en treden onregelmatigheden in de groei op dan stijgt het aandeel amylopectine.

Amylopectine heeft een vertakte structuur en is daardoor lastiger af te breken voor bacteriën in de dunne darm van de koe. Al dit onverteerde bestendige zetmeel komt terecht in de dikke darm, waar het een voedingsbron is voor onder andere E-coli bacteriën. Deze bacteriën komen terecht in de mest en kunnen van daaruit de koe weer besmetten. Een voor de hand liggend effect is een verhoogd risico op coli-mastitis. Maar via de schede komen de bacteriën ook terecht in de baarmoeder waar ze baarmoederontstekingen kunnen veroorzaken.

Vruchtbaarheidshormoon

De gifstoffen die de bacteriën produceren, remmen rechtstreeks de vruchtbaarheid. Indirect

is het negatieve effect op de vruchtbaarheid nog veel groter. Onderdelen van de wand van de colibacteriën, de zogenoemde lipopolysachariden (LPS), komen namelijk terecht in het bloed en bereiken zo de hypofyse, een klier onder de hersenen die een groot aantal hormonen produceert. De lipopolysachariden remmen daar de afgifte van verschillende vruchtbaarheidshormonen. Gevolg: cysteuze follikels, geen eisprong en slechte tochtverschijnselen.

De lipopolysachariden die via besmetting van de baarmoederwand in het bloed terechtkomen, belasten ook de lever. Bovendien komen bij ontstekingsreacties in de baarmoeder zogenaamde cytokines en interleukines vrij die ook weer een belasting zijn voor de lever. Het orgaan dat zorgt voor het ontgiften van het lichaam, kan daardoor niet optimaal functioneren en dat maakt de koe gevoeliger voor allerlei ziekten.

Vetzuren

Daarnaast is er nog een andere reden waarom maïs ongezond zou zijn. Die heeft betrekking op de vetzuursamenstelling van het vet in maïs. Van de vetzuren in maïs bestaat 5 procent uit zogenaamde Omega 3-vetzuren en 55 procent uit Omega 6-vetzuren. In grassen en klavers is deze verhouding heel anders: 55 om 15.

Omega 3-vetzuren worden beschouwd als gezond, omdat ze het afweersysteem van mensen en dieren activeren. Bovendien hebben ze een positief effect op de vruchtbaarheid. Omega 6-vetzuren daarentegen stimuleren juist ontstekingsreacties. Waarmee niet gezegd is dat Omega 6-vetzuren per definitie slecht zijn, maar het gaat om de juiste verhouding en die is in gras gunstiger dan in maïs.

De ongunstige vetzuursamenstelling van de maïs die aan koeien wordt gevoerd, komt ook terecht in de vetreserves van het dier. Als koeien in een negatieve energiebalans raken en het vet wordt afgebroken, worden deze vetzuren weer afgegeven aan het bloed. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die zichzelf ook nog eens versterkt. Dit verklaart wellicht waarom de vruchtbaarheid op veel bedrijven afneemt naarmate de koeien ouder worden. Ook het verschijnsel dat koeien na drie lactaties lijken te zijn 'opgebrand' zou hierdoor verklaard kunnen worden.

Stoppen met maïs?

Moeten we dan maar radicaal stoppen met het voeren van maïs? Dat zou misschien wel het beste zijn, maar gezien de vele voordelen van het gewas zal dat natuurlijk niet zo snel gebeuren. Je zou het aandeel maïs wel kunnen beperken, bijvoorbeeld tot maximaal een kwart van het rantsoen.

En kijk ook eens naar de omstandigheden waaronder de maïs gegroeid is. Een voederwaarde op papier zegt nog niets over de samenstelling van het zetmeel. Zolang maïszetmeel in de pens en de dunne darm wordt verteerd, is er niet zo veel aan de hand. Maar als de mest blijft plakken aan de klauwen van de koeien en schuimt in de put, dan is er nog te veel onverteerd zetmeel aanwezig en is de kans groot dat de gezondheid van de koeien er onder lijdt.

Penskarakter snijmais toont verandering in de kuil

Snijmaiskuilen met veel bestendig zetmeel verliezen in relatief korte tijd ook veel van deze bestendigheid. Dat blijkt uit onderzoek van Eurofins Agro dat de basis vormt voor Penskarakter snijmaïs dat vanaf dit jaar te vinden is op de analyseverslagen.

Snijmais is een van de meest favoriete voedergewassen in de melkveehouderij. De teelt en de opslag zijn relatief gemakkelijk te managen en de voederwaarde is altijd goed. Of toch niet? De snijmaiskwaliteit is gedurende de opslag namelijk niet constant. Ingekuilde mais wordt na verloop van tijd steeds sneller verteerbaar.

Hogere verteringssnelheid

Hoe zit het dan het verlies aan bestendig zetmeel? Het aandeel bestendig zetmeel daalt met name in de eerste 3 maanden na het inkuilen. Na één jaar hebben alle kuilen nog 20% bestendig zetmeel over. Dat betekent dat een kuil met hoog bestendig zetmeelpercentage relatief sterker daalt in bestendigheid, dan een maiskuil met een laag bestendig zetmeelpercentage. De afname van de bestendigheid zorgt voor een hogere verteringsnelheid naarmate de maiskuil langer in opslag zit.

Totale voederwaarde verandert

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat niet alleen de verteringssnelheid, maar ook de totale voederwaarde verandert gedurende de opslagperiode. Zo daalt het totale zetmeelgehalte over een jaar gemiddeld zo'n 20 gram per kg droge stof. De variatie hierin is echter groot: van 0 tot bijna 100 gram zetmeeldaling per kg droge stof.

Oorzaak: bacterieactiviteit

Zowel de daling van het zetmeelgehalte als de bestendigheid van het zetmeel wordt veroorzaakt doordat, door bacterieactiviteit tijdens het fermentatieproces, de beschermlaag (proline) rondom de maiskorrels wordt afgebroken. Met de nieuwe methode van Eurofins Agro is het mogelijk om deze eiwitafbraak te meten. Daarmee wordt duidelijk of er veel of weinig verliezen verwacht worden in de komende periode. Zo krijgt u meer inzicht in de kwaliteit van de maiskuil tijdens de opslag en kunt u tijdig bijsturen op het rantsoen om de melkproductie te waarborgen.

Invloed op de melkproductie

De bestendigheid van het zetmeel heeft een duidelijke invloed op de melkproductie. Hoe meer bestendig zetmeel wordt gevoerd, des te hoger de productie. Het effect is echter het sterkst bij een laag aandeel snijmais (< 50%) in het rantsoen. Wanneer veel mais wordt gevoerd, is het totale aanbod van bestendig zetmeel meestal voldoende voor een hoge productie. Dan maakt de bestendigheid van de kuil niet zoveel meer uit. De bestendigheid kan in dat geval zelfs te hoog zijn: wordt er meer dan 1400 g bestendig zetmeel (BZET) per koe per dag gevoerd, dan zal het zetmeel in de darm minder effectief opgenomen worden. Overtollige zetmeel wordt zelfs uitgescheiden.


Het totale energiegehalte in de mais, uitgedrukt in VEM, heeft niet zozeer invloed op de totale melkproductie, maar wel duidelijk op het eiwitgehalte in de melk. De korrelkneuzing is

hierbij van belang. Hoe beter de korrel gekneusd wordt, des te hoger het VEM-gehalte van de maiskuil. Een onvoldoende gekneusde korrel kost melkeiwit.

Penskarakter op het verslag

De combinatie van het aandeel bestendig zetmeel en de energie (VEM) van de maiskuil, zijn verwerkt in Penskarakter snijmais. Samen geven ze immers een indicatie hoe goed de koe met de kuil vooruit kan. Hoe leest u Penskarakter?

- Het groene deel linksboven A is het optimum voor de koe: veel energie (VEM) en een hoog bestendig zetmeelpercentage in de maiskuil. Snel verteerbare kuilen met weinig VEM zijn minder wenselijk (rood gedeelte D).
- De gele driehoek geeft de kwaliteit weer op het moment van monsternamen.
- Het blauwe rondje vertelt hoe deze mais is veranderd na 6 maanden.



Zie afbeelding hier rechts.

Droge stof en haksellengte

Niet alle snijmaiskuilen veranderen veel in het seizoen. Belangrijk is de basis; een schoon product goed inrijden. Hierdoor is er minder intreding van zuurstof en wordt de kans dat verkeerde gisten en schimmels zich gaan manifesteren tot een minimum beperkt. Maar er zijn ook andere factoren van invloed: met name het droge stofpercentage in combinatie met de haksellengte. Vochtige kuilen (<35% DS) die fijn zijn gehakseld (tot 8 mm theoretische haksellengte) vormen méér zuren dan drogere snijmaiskuilen die fijn zijn gehakseld. Deze zijn dus gevoeliger voor verlies.

Denk aan de voersnelheid!

Fijn hakselen in combinatie met droger inkuilen leidt tot stabiele kuilen die in het seizoen niet veel zullen veranderen. Grover hakselen (> 10mm theoretische haksellengte) adviseert Eurofins Agro alleen bij snijmaiskuilen die tot 35% droge stof worden ingekuild in combinatie met een hoog rantsoenaandeel. Grover gehakselde kuilen zijn moeilijker aan te rijden en hebben een lagere dichtheid, zeker als de snijmais droog ingekuild wordt. Een hoge voersnelheid is bij deze kuilen essentieel. Ons advies in het kort:

Bij een ruwvoeraandeel snijmais van minder dan 50% in het rantsoen (droge stof):

- Haksellengte: maximaal 9 mm - goed in te rijden en stabiele conservering
- Percentage droge stof: minimaal 38% - maximale afrijping, veel bestendig zetmeel

Bij een ruwvoeraandeel snijmais van meer dan 50% in het rantsoen (droge stof):

- Haksellengte: vanaf 10 mm – meer structuur uit snijmais
 - Percentage droge stof: maximaal 35% - optimale conservering
-
-

Vragen en opdrachten bij beoordelen snijmaïs:

70) Verklaar dat snijmaïs goed past in een rantsoen met veel gras (kuil en vers).

71) Hoeveel procent eiwit zit er in snijmaïs.

72) Waarom past snijmaïs vooral goed in rantsoenen van nieuwmelkte koeien. Verklaar waarom koeien van snijmaïs goed melk kunnen geven.

73) Welke eigenschap heeft het zetmeel in maïs ten opzichte van zetmeel in tarwe of gerst en wat is hier het voordeel van.

74) Welk voordeel heeft snijmaïs in het rantsoen van de droge koeien.

75) Verklaar dat door het toevoegen van snijmaïs als ruwvoer in het rantsoen de DS-opname van de koeien omhooggaat.

76) Op welke manier kun je de structuurwaarde van snijmaïs beïnvloeden.

77) Wat is de meest ideale haksellengte van snijmaïs. Verklaar je antwoord. Waarom niet te kort of niet te lang.

78) Beoordeel de snijmaïs analyse op blz 41 en 42.

Snijmaïs 1

Snijmaïs 2

79) Zie artikel "Kritiek op bestendig zetmeel in snijmaïs".

- a. Wat wordt er verstaan onder "stay green" snijmaïs rassen en wat is het voordeel hiervan.

- b. Waarom is snijmaïs minder geschikt voor oudmelkte koeien.

- c. Waar wordt onbestendig zetmeel afgebroken en waar bestendig zetmeel.

- d. Onder welke omstandigheden vormt er in de maïs amylopectine en wat is het nadeel hiervan.

- e. Hoe kun je in de stal waarnemen dat er eventueel nog te veel niet afgebroken maïs zetmeel in de mest zit.

80) Zie artikel "Penskarakter snijmaïs toont verandering in de kuil."

- f. Wat gebeurt er met het zetmeel in snijmaïs gedurende de tijd dat het is ingekuuld.

g. Wat voor gevolgen heeft dit voor de verteringssnelheid.

h. Welke maatregelen kun je nemen (bij een aandeel van < 50% snijmaïs) om te voorkomen dat de bestendigheid van zetmeel te veel afneemt.

i. Kun je verklaren waarom snijmaïs analyse 2 sneller is als analyse 1 (blz. 41 en 42).

j. Welke van de 2 snijmaïs analyses (blz. 41 en 42) heeft meer kans op pensverzuring. Verklaar je antwoord.

Hoofdstuk 2: Ruwvoerbalans

Met een ruwvoerbalans, ook wel stalvoederbalans genoemd, kan een veehouder inschatten of er voldoende ruwvoer aanwezig is voor het komende jaar. Bij een tekort zal er aangekocht worden en bij een overschot kan men overwegen om een deel te verkopen.

2.1: Ruwvoer voorraad

Hoeveel kg DS ruwvoer is er op het bedrijf gewonnen? Je moet hierbij hoofdzakelijk denken aan kuilgras, hooi en snijmaïs. Voer wat is aangekocht telt dus niet mee.

Om te bepalen hoeveel kg DS er in een kuilbult of sleufsilos zit, wordt de onderstaande tabel gebruikt. Bron WUR

Tabel 5.13 M³-gewichten van gras- en snijmaïskuil¹ (gemiddelde hoeveelheid droge stof in kg/m³)

Stapelhoogte Opslag in:	< 1,30 m		1,30 - 1,80 m		> 1,80 m		Spreiding ⁴ (%)
	Rijkuil	Sleufsilos	Rijkuil	Sleufsilos	Rijkuil	Sleufsilos	
Graskuil²							
<i>Zonder gronddek</i>							
< 35 % ds	175	185	195	205	210	220	± 15
> 35 % ds	195	205	205	215	215	225	± 15
<i>Met gronddek</i>							
< 35 % ds	205	210	215	220	225	230	± 10
> 35 % ds	215	220	225	230	235	240	± 10
Snijmaïskuil³							
<i>Met gronddek</i>							
< 25 % ds	210	220	220	235	235	245	± 10
25-30 % ds	220	235	235	245	245	260	± 10
30-35 % ds ⁵	235	245	245	260	260	270	± 10
Grootpakbalen⁶							
Kg product/m ³ = 994,81 – 0,5335 x ds-gehalte (g/kg) – 1,196 x ruwe celstofgehalte (g/kg ds)							
Kg ds/m ³ = kg product/m ³ x (ds-gehalte (g/kg) / 1000)							± 10

¹ De m³-gewichten hebben betrekking op geconserveerd en bezakt ruwvoer.

² Ongehakseld. Voor gehakseld gras moeten de vermelde gegevens met circa 10 procent worden verhoogd.

³ Voor rijkuilen en sleufsilos's zonder gronddek moeten de vermelde gegevens met circa 5 procent worden verlaagd.

⁴ Dit betreft een normale spreiding. Bij meer extreme omstandigheden is de spreiding groter.

⁵ Boven 35 procent droge stof kan de dichtheid weer afnemen, met name bij kuilen zonder gronddek.


⁶ Type en merk van de grootpakpers hebben invloed op de dichtheid.

Kg DS in ronde en vierkante balen

Uit onderzoek bleek dat naast het gehalte aan droge stof (DS) ook ruwe celstof (RC) duidelijk invloed heeft op de dichtheid van ronde en vierkant kuilbalen. Hoe hoger het gehalte aan ruwe celstof, des te slechter is het materiaal te verdichten. De dichtheid van deze balen wordt daarom nu berekend aan de hand van het DS-gehalte en het RC-gehalte via de volgende formule:

$$\text{Kg product/m}^3 = 994,81 - 0,5335 \times \text{DS-gehalte (g/kg)} - 1,196 \times \text{RC-gehalte (g/kg DS)}$$

Vragen en opdrachten over ruwvoer voorraad:



← Dwarsdoorsnede




1) Gebruik de afbeelding van de bovenstaande sleufsilos.

a. Bereken de inhoud van het kuilgras.

b. Lees in de tabel af hoeveel kg DS er in 1 m^3 zit, als het DS-gehalte 40% is, er geen gronddek op de kuil zit en het gras is gehakseld.


c. Hoeveel kg DS zit er totaal in de sleufsilos (zonder gronddek).

- d. Hoeveel kg DS kuilgras zit er in, als het een rijkuil is, er wel een gronddek op de kuil zit, maar het gras niet is gehakseld.



← Breedte doorsnede

Lengte doorsnede ↓



- 2) Gebruik de afbeelding van de bovenstaande sleufsilo.

- a. Bereken de inhoud van de snijmaïskuil.

- b. Lees in de tabel af hoeveel kg DS er in 1 m^3 zit, als het DS-gehalte 38% is en er geen gronddek op de snijmaïs zit.

- c. Hoeveel kg DS zit er totaal in de sleufsilo (zonder gronddek).

- d. Hoeveel kg DS snijmaïs zit er in, als het een rijkuil was en er wel een gronddek op de kuil zit en het DS-gehalte 34% is.

	Resultaat product	droge stof	Streef-traject	Gem. <15-6		Resultaat droge stof	Streef-traject	Gem. <15-6	
DS	403		450-700	**	554	Ruw as	108	90-120	98
pH	4,8		4,3-5,2		5,5	VCOS (%OS)	79,1	72-76	74,1
Boterzuur	2,5		< 3,0		1,8	NH ₃ -fractie (%RE)	8	< 8	7
Azijnzuur	10		1-10		7	Nitraat	3,6	< 7,5	2,1
Melkzuur	54		15-40		16	Ruw eiwit	174	140-170	142
VEM	380	944	830-890		860	Ruw eiwit totaal	189	150-190	152
VEVI	396	984	840-920		879	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	66	40-60	56
DVE+	25	63	60-80		61	Ruw vet	47	30-50	34
OEB+	25	63	10-50		30	Ruwe celstof	257	230-280	264

- 3) Gebruik de afbeelding boven en rechts.

- a. Bereken de inhoud van de ronde baal.



- b. Bereken de kg DS/m³

- c. Hoeveel kg kuilgras zit er in de ronde baal.

Bij de opgave op de vorige bladzijde heb je moeten berekenen (vraag b) hoeveel kg DS er in 1 m³ zit. Je kunt op de onderstaande afbeelding kijken of je het antwoord goed hebt.

Partij-inhoud BEX	Resultaat product	droge stof	Voederwaarde	Resultaat product	Droge stof
Hoogte (m)	1,20		Drogestof (g/kg)	403	
Diameter (m)	1,3		VEM/kg		944
Aantal balen	158		Ruw as (g/kg)		108
Inhoud (m ³)	252		Ruw eiwit totaal (g/kg)		189
Dichtheid (kg/m ³)	473	190	Stikstof (g/kg)		30,2
Hoeveelheid (ton)	119,0	47,9	Fosfor (g/kg)		3,6
kVEM (*1000 VEM)	45226		Partij		
Ruw as totaal (kg)	5172		Opslag:	Ronde balen (snij)	
Ruw eiwit totaal (kg)	9046		Materiaal gehakseld?	Nee	
Stikstof (kg)	1447		Gronddek, toplaag?	-	
Fosfor (kg)	172				

Op de kuilanalyses kun je bij "Partij-inhoud BEX" dus ook aflezen hoeveel ruwvoer er in de kuil zit. Zie ook onderstaande afbeelding.

Partij-inhoud BEX	Resultaat product	droge stof	Voederwaarde	Resultaat product	Droge stof
Lengte (m)	51,0		Drogestof (g/kg)	371	
Breedte (m)	10,8		VEM/kg		922
Hoogte (m)	3,10		Ruw as (g/kg)		93
Inhoud (m ³)	1707		Ruw eiwit totaal (g/kg)		173
Dichtheid (kg/m ³)	652	242	Stikstof (g/kg)		27,6
Hoeveelheid (ton)	1114,0	?	Fosfor (g/kg)		3,6
kVEM (*1000 VEM)	380814		Partij		
Ruw as totaal (kg)	38429		Opslag:	Rijkuil	
Ruw eiwit totaal (kg)	71405		Materiaal gehakseld?	Ja	
Stikstof (kg)	11425		Gronddek, toplaag?	-	
Fosfor (kg)	1488				

- 4) Bereken van de graskuil in de bovenstaande afbeelding, hoeveel kg DS erin zit. Je kunt dit op twee manieren berekenen.

2.2: Ruwvoer behoefte veestapel

In de onderstaande tabel staat de ruwvoerbehoefte van de veestapel

Diergroep	Opname in kg DS
Melkkoeien	14 kg DS (12 à 15)
Droge koeien	12 kg DS (11 à 13)
Pinken	7 kg DS
Kalveren	3,5 kg DS
Ooien	1,5 kg DS

De ruwvoer opname wordt medebepaald door;

- Kwaliteit van het ruwvoer (VEM/kg DS)
- Melkproductie.

Hoe hoger de kwaliteit, des te hoger is de opname. Gemakshalve kun je zeggen dat 50 VEM extra, een 0,5 kg DS hogere opname geeft. Dit zie je ook weer terug in de verzadigingswaarde (VW). Hoe beter de kwaliteit, hoe hoger de VCOS, des te lager is de VW van het ruwvoer.

Ook de melkproductie speelt een rol. Een hoogproductieve koe neemt meer kg DS voer op.

Als vuistregel houden we voor ruwvoer opname per dag per dier de volgende regel aan;

14 – 7 – 3,5 (mk – pi – ka)

Vragen en opdrachten over de ruwvoerbalans:

- 5) Maak een ruwvoerbalans (kuil gras is niet gehakseld).
- a. Bereken hoeveel kg DS ruwvoer er op het bedrijf is gewonnen. Gebruik hiervoor de tabel op blz 51.
- Partij 1: Kuilgras (40% DS) in sleufsilo zonder gronddek 45 x 8 x 2,5m.
 - Partij 2 2: Kuilgras (33%DS) in rijkuil met gronddek 40 x 6 x 1,5m.
 - Partij 3: Kuilgras (50% DS en RC 286) in 55 ronde balen (d = 1,2m en h = 1,4m).
 - Partij 4: Snijmaïs (38% DS) in sleufsilo met gronddek 20 x 6 x 2,2m.

- b. Bereken de behoefte van de veestapel.
- Aantal melkkoeien is 100 met 200 staldagen.
 - In de weideperiode (165 dagen) wordt er 6 kg DS/koe/dag bijgevoerd.
 - Aantal pinken is 30 met 200 staldagen.
 - Aantal kalveren is 35 met 365 staldagen.

- c. Bereken hoeveel kg DS ruwvoer er tekort/overschot is.

- d. Hoeveel ton snijmaïs moet er aangekocht worden als het DS-gehalte van de maïs 35% is. Hou hierbij ook rekening met 5% bewaar- en voer verliezen.

- e. De aangekochte snijmaïs komt in een rijkuil (met gronddek). Hoe lang moet deze rijkuil zijn, als de breedte 6m en de hoogte 1,5m is.

- f. Wat gaat dit kosten?

- g. Is het noodzakelijk dat de veehouder snijmaïs aankoopt? Had de veehouder ook niks kunnen aankopen of een ander voedermiddel?

Werkblad Ruwvoerbalans

Voorraad ruwvoer				
Voedermiddel / kuilnummer	DS%	Inhoud in m ³	Kg DS per m ³	Kg DS totaal
Totale voorraad ruwvoer (a)				

Samenstelling veestapel				
Diergroep	Aantal	Aantal staldagen	Kg DS opname per dier per dag	Totale behoefte
Totale kg DS behoefte van de veestapel (b)				

Totale voorraad kg DS ruwvoer (a)	
Totale kg DS behoefte van de veestapel (b)	
Ruwvoer overschot / tekort in kg DS (a – b)	

- 7) Maak een ruwvoerbalans van voorbeeld bedrijf 4. Je mag daarbij de onderstaande tabel voor gebruiken of Excel. Zie onderstaande link voor gegevens.

<https://maken.wikiwijs.nl/88871/Voerplan#!page-5210178>

Voorraad ruwvoer				
Voedermiddel / kuilnummer	DS%	Inhoud in m ³	Kg DS per m ³	Kg DS totaal
Totale voorraad ruwvoer (a)				

Samenstelling veestapel				
Diergroep	Aantal	Aantal staldagen	Kg DS opname per dier per dag	Totale behoefte
Totale kg DS behoefte van de veestapel (b)				

Totale voorraad kg DS ruwvoer (a)	
Totale kg DS behoefte van de veestapel (b)	
Ruwvoer overschot / tekort in kg DS (a – b)	

Hoofdstuk 3: Voersnelheid

Als een kuil wordt geopend om van te voeren, is het belangrijk dat het voer dan ook goed blijft. Ten aller tijde moet voorkomen worden dat er broei en schimmelvorming in de kuil ontstaat. Het gevolg hiervan is;

- Verlies van voederwaarde
- Smaakverlies, dus mindere opname
- Nadelig effect op de pensmicroben
- Mogelijk vergiftiging van vee door schimmels

Hoe ontstaat broei en schimmelvorming

Broei en schimmelvorming kunnen alleen gebeuren als er lucht bij aanwezig is. Bij volledige afsluiting van zuurstof komen ze daarom niet voor, dus wanneer de kuilbult of ronde baal dicht zit. Voor het voeren moet de bult open. Hierdoor kunnen bepaalde groepen bacteriën en schimmels actief worden. Zij gebruiken koolhydraten (suikers) en ook organische zuren. Dit heeft een temperatuurstijging, smaak- en voederwaardeverlies tot gevolg. Deze verliezen kunnen oplopen tot 3 à 5% per dag.

Wanneer spreken we van broei

De temperatuur op de dag van het inkuilen bepaald de temperatuur in de kuil. Dus als er wordt ingekuild bij een temperatuur van 25 graden C, dan zal bij het openen van deze kuil dat ook de temperatuur in de bult zijn. Meet je in deze zelfde kuil op een gegeven moment een temperatuur van 35 graden, dan kan je dus spreken van broei. In het artikel hieronder, wordt bij 8 graden verschil over broei gesproken. Er zijn ook adviseurs die bij een verschil van 5 graden spreken over broei.

Voersnelheid

De voersnelheid moet hoog liggen om broei en schimmelvorming te beperken.

- 1,5 meter per week bij kuilen die zijn afgedekt met een laag grond
- 2 meter bij kuilen zonder gronddek.

Het is dus belangrijk om voor het inkuilen na te gaan welke afmetingen van de kuil hierbij passen. Hoe smaller en lager de kuil, des te groter is de voersnelheid.

Maatregelen ter voorkoming van broei en schimmelvorming;

- Drogestof gehalte van kuilgras < 50%
- Drogestof gehalte bij snijmais < 38%
- Bij hogere DS-gehaltes is het lastiger aanrijden
- Hakselen
- Zorg voor vlak snijvlak
- Laat de kuil niet openliggen, maar dek het steeds weer af
- Gebruik broeibestrijdingsmiddelen als de kuil te warm wordt.

Maak na het inkuilen de bult niet te snel open. Graskuilen moeten minstens 6 weken dicht blijven voordat ze worden opengemaakt.

Voorbeeldberekening van voersnelheid per week:

Gegeven: 100 melkkoeien Opname kuilgras 12 kg DS/dag/koe
Afmetingen kuil: lengte = 40 m; breedte = 8 m; hoogte = 2,5 m
Het kuilgras zit in een sleufsilos zonder gronddek
In 1 m³ kuilgras zit 220 kg ds.

Berekening: $100 \times 12 = 1200 \text{ kg DS} \times 7 \text{ dagen} = 8400 \text{ kg DS/week}$
 $8400 \text{ kg DS/week} : 220 \text{ kg DS/m}^3 = 38 \text{ m}^3/\text{week}$
 $38 \text{ m}^3/\text{week} : 8 \text{ m} : 2,5 \text{ m} = 1,9 \text{ m/week}$

Conclusie: Voersnelheid is te laag, moet minimaal 2 m zijn.

Bron: Boerderij (april 2014)

Broei in bijna helft graskuilen

Ferwert – In bijna de helft van de graskuilen is broei aangetroffen tijdens onderzoek door handelsonderneming Hoogland. De onderneming liet stagiair Gerard Postma van Van Hall Larenstein op 73 Friese melkveebedrijven de graskuilen onderzoeken. Bij 32 graskuilen is broei geconstateerd. Er is volgens Hoogland sprake van broei als er meer dan 8 graden verschil is tussen de boven- en onderlaag of tussen het snijvlak en verder in de bult. Met een steekthermometer is op tien verschillende plaatsen in de kuilbult de temperatuur gemeten. Daarnaast is onder meer gekeken naar het drogestofpercentage, de aanwezigheid van grond in de kuil en het toegepaste afdeksysteem.

20 procent van de kuilen waren te droog (boven 48 procent) of te nat (minder dan 30 procent). In een derde van de graskuilen werd zichtbaar grond gevonden. Dit is ongewenst in verband met de mogelijke aanwezigheid van boterzuurbacteriën en de kwaliteitsbeïnvloeding van de geleverde melk. Graskuilen afgedekt met grond waren tussen de 5 en 10 graden kouder dan kuilen afgedekt met autobanden en dekzeil. De met grond afgedekte kuilen hadden minder last van broei. Luchtindringing door slechte afdekking was bij een vijfde van de graskuilen een probleem. Hierdoor lag de temperatuur 5 graden hoger. Gehakseld gras zorgt voor een 2 tot 4 graden lagere temperatuur. Gemiddeld is de temperatuur van het snijvlak van een graskuil behandeld met een toevoegmiddel ruim 3 graden lager ten opzichte van het midden van de kuilbult dan bij een onbehandelde bult.

Uitgaande van 1 VEM verlies per dag per kilo drogestof per graad, rekent Hoogland voor dat dit per week bij acht graden broei om 56 VEM gaat. Bij een drogestofopname van 12 kilo per dag scheelt dit 672 VEM per dag. Voor 1 liter meetmelk is 460 VEM nodig. Het verlies is dus ongeveer 1,5 liter per koe per dag.

Vragen en opdrachten over voersnelheid:

- 1) Wat moet de voersnelheid per week zijn bij een kuilplaat/sleufsilo.

Zonder gronddek = _____

Met gronddek = _____

- 2) Wat kan een veehouder tijdens het inkuilen doen om broei te voorkomen.

- 3) Wat kan een veehouder doen als er broei in de kuil zit.

- 4) Van een melkveebedrijf zijn de volgende gegevens bekend;

- 150 melkkoeien
- Er wordt per dag 3.750 kg kuilgras gevoerd (DS-gehalte = 40%)
- Het gras is gehakseld
- Sleufsilo zonder gronddek heeft de volgende afmetingen (45 m x 8 m x 3 m)

- f. Bereken de voersnelheid per week.

- g. Hoeveel dagen kan er van deze kuil gevoerd worden.

Partij-inhoud BEX	Resultaat product	droge stof	Voederwaarde	Resultaat product	Droge stof
Lengte (m)	30,0		Drogestof (g/kg)	414	
Breedte (m)	8,4		VEM/kg		1024
Hoogte (m)	1,40		Ruw as (g/kg)		38
Inhoud (m ³)	353		Ruw eiwit totaal (g/kg)		87
Dichtheid (kg/m ³)	614	254	Stikstof (g/kg)		14,0
Hoeveelheid (ton)	216,6	89,8	Fosfor (g/kg)		2,1
kVEM (*1000 VEM)	91929		Partij		
Ruw as totaal (kg)	3411		Opslag:	Sleufsilos	
Ruw eiwit totaal (kg)	7834		Gronddek, toplaag?	Ja	

5) Gebruik de bovenstaande afbeelding van een snijmaïskuil, voor het beantwoorden van de vragen.

- a. Op een melkveebedrijf zijn 175 melkkoeien aanwezig. De veehouder wil 3 kg DS snijmaïs per koe, per dag voeren. Bereken of de voersnelheid per week voldoende is.

- b. Bereken hoeveel kg DS er per koe gevoerd moet worden om een voersnelheid van 2 meter te halen.

- c. Hoeveel kg snijmaïs moet er dan per dag aan 175 koeien gevoerd worden.

6) Gebruik voor deze gegevens voorbeeld bedrijf 1. Zie onderstaande link.

<https://maken.wikiwijs.nl/88871/Voerplan#!page-2587487>

- a. De melkkoeien krijgen 6 kg DS van kuilplaat 4 gevoerd. Bereken de voersnelheid per week.

- b. Hoeveel dagen kan er van kuilplaat 4 aan de melkkoeien gevoerd worden.

- c. De veehouder wil binnenkort de melkkoeien van kuilsilo 2 gaan voeren. Op deze silo zit geen gronddek. Bereken hoeveel kg DS er per koe/dag gevoerd moet worden om voldoende voersnelheid te halen.

- d. Bereken de voersnelheid per week van maïssilo 3 als er 4 kg DS/dag/koe gevoerd wordt aan de melkkoeien en 3 kg DS/dag/koe aan de droge koeien.
